

洗冤錄詳義

洗冤錄詳義卷三

海甯許樾編校

疑難雜說

可疑
難臨時
審察

勒殺類自縊溺死類投水奴婢捶撻
在主家自盡俱詳前毆勒假作自縊
及溺水辨生前死後各條
刑律關毆例云一原毆並非致命之
處又非極重之傷越五日因風身死
者免抵擬以杖流若死在五日以內
仍絞候如當致命之處傷輕或傷重
非致命之處因風死在十日以外方
準改流其致命傷重及雖非致命傷
至骨損骨斷即因風死在十日以外
仍擬絞抵若正限外餘限內因風身
死照毆至廢疾律杖徒至餘限外因

凡檢屍差之毫釐失之千里切勿輕
視常有勒殺類乎自縊溺死類乎投
水關毆有在限內致命而實因患病
身死僕婢因被捶撻在主家自害自
縊之類情迹不同並為疑難務須臨
時審察

刃傷

風身死止科傷罪其因患病身死與本傷無涉者仍依律從本毆傷法

殺傷篇云被快物傷死者看原著衣衫有無破損處隱對痕血點可驗

集韻擯取亂切音擯擯也

酒醉及失腳自傷

凡檢驗疑難屍首如刃物所傷透過者須看內外瘡口大處爲行刃處小處爲透過處如屍首已爛須看其原衣服比傷著去處屍或覆卧其右手有短刃物及竹頭之類自喉至臍下者或是酒醉擯倒自壓自傷如貼近有登高處或泥中須看身上有無他故錢物有無損動處恐因取物失腳自傷之類

腐爛無
迹可憑
驗顛門
骨

命門骨
手擊立
斃

正骨心法云顛頂骨一名天靈蓋位
居至高內通腦髓以統全體是天靈
蓋即頂心骨非顛門也
安徽省奏手指掐傷咽喉死者生前
氣噪處所被掐指痕尚未實靠喉骨
皮肉消化之後其骨色作何檢驗刑
部議覆氣噪被掐正與疑難雜說
絕呼吸氣血上湧之條相符只檢
門一骨便明等因乾隆三十五年成
案

將人致死或經久屍肉腐爛無跡可
憑者但檢驗顛門一骨諺稱天靈蓋
必浮出腦殼骨縫之外少許其骨色
淡紅或微青皆因暈音絕呼吸氣血
上湧所致只撥驗此骨便明
凡命門骨最屬虛怯以手擊之即可
立斃因命門骨左右兩穴有紅筋若
細絲通於兩內腎拍斷即死外無痕
跡若有告稱拍著命門處身死只檢

命門骨即骨格內所載腰眼骨之第一節也。自尾蛆骨倒數第八髓此作第七髓誤。詳見骨格內腰眼骨條上層。

屍無痕損宜詳

洗冤錄表云此是不知有無爭鬪而屍無痕損者是一疑難。

元槩本洗冤集錄及平冤錄捫並作搗案搗俗搗字。

搗捫殺面色必紅。若檢骨其面上眉棱等骨及兩腳後跟骨俱紅。氣不得出塞於胸間故肉硬。

驗命門骨紫赤者即是其命門骨自

尾蛆骨倒數上第七髓兩旁各有一

小穴者是。

凡屍身無痕損惟面色有青黯或一

邊似腫多是被人以物搭口鼻及罨

捫殺或是用手巾布袋之類絞殺故

不見痕須看項上肉硬此最爲切要。

處手足有無繫縛痕舌上或有嚼破

痕大小便二處或有踏腫痕若無此

關毆分
散失跌
落水淹
死

方書云經喉風喉腫而大喉內有紅
絲纏繫或兩頤及項赤色纏連口多
涎沫手指甲青頃刻即死

患各本譌有據元槧本改

此專指關毆之後言之須看明分散
二字若當場因打而失跌落水難以
並論矣

淹各本譌泔據舊鈔本改說文泔雲
雨貌與淹之訓沒義異

類方看口內有無涎唾喉間腫與不
腫如有涎及腫恐患纏喉風死或是
酒醉卒死宜詳

有關毆之後各自分散或近江河池
塘洗頭面血或取水喫但因相打力
乏或因醉相打後頭暈音運失跌落水
淹死初落水時尙活其屍腹肚膨脹
十指甲內有沙泥兩手向前此是落
水淹死相驗分明雖有毆擊痕損去

辜限數語可與律例參用

相打分散乘高失腳身死

生前奔跑忿激氣血湧逆身死者面色黃瘦口鼻有血見成案

爭鬪致死屍無

此明知爭鬪而屍無痕損極宜詳細推鞠方無枉縱

處一一填入驗狀定作毆後落水致命緣打傷雖在要害處尙有辜限及限外以他故死者各依本毆傷法此既是落水身死則雖有傷痕其實以他故死○更有相打分散後乘高撲下而死者但須驗失腳處高下撲損痕癍致命要害處仍根究眼見相打分散之證佐人恐爲相打者所擠故須詳究凡因爭鬪致死而屍上並無痕損此

痕損

成案質疑駱好學姪女被曹氏迷拐將曹氏捉獲先以拳掌打其腮腴繼以樹枝打其左腿均係輕傷曹氏忽稱腹痛倒地旋即殞命驗得上下牙齒各指甲俱青色屍子供伊母夙患陰寒病證不時舉發其為臨毆適值病發自斃無疑擬杖完結

宋本或字下有一個或兩個五字今脫去非是洗冤辨正云一個縮上亦可致死如何可去此五字

年老虛弱爭鬧氣絕

此與上條均以腎子縮上為憑洗冤集編云凡年老人以手搏之而氣亦絕是無痕也

或是被傷人舊有宿患氣疾或是未毆以前先曾飲酒至醉及爭鬪時有所觸礙以致氣絕而死也如此者腎子或縮上不見須用溫醋湯蘸音贊衣服或繇絮之類罨一飯時令件件以手按小腹下其腎子自下即其驗也然後子細看要害致命處有年老虛弱之人與人爭鬧登時氣絕沿身無傷更驗腎囊兩子多是一

各本腹下謬作肚腹據舊鈔本改觀
前條亦有此語可以互証

驗無傷
損又無
病狀

檢婦人無傷損處須看陰門恐自此
入刃於腹內離皮淺則臍上下微有
血沁深則無如男子須看頂心囊門
恐有平頭釘硬物刺入
火燒釘子插入骨內其血不出亦不
見形迹

被殘害
死

要錄凡被人用秤桿通入糞門死者
兩眼胞膜起兩手腳拳縮大腸拖出
四五寸

被打後
服毒自

被打服毒証以自服毒藥須參看後
服毒篇死後用繩吊起死後推在水

箇縮上須用手按小腹下則腎子自
下。

驗屍諸處並無傷損又無病狀難爲
定驗者恐是被人將刃物釘入顙門
或腦中致命先須令屍親干證人等
立狀訖然後剷除死人髮髻驗之
如被殘害死者須檢齒舌耳鼻內或
手足指甲中有簽刺之類

凡檢驗屍首指定作被打後服毒身

縊投水
身死

中須參看被毆勒假作自縊及溺水
辨生前死後篇

洗冤集編載甲乙同行乙有隨身衣
服而甲欲謀之行至鄒河甲執乙就
水而死驗得乙屍瘦怯胸前赤色肚
腹脹口唇青十指甲黑黯色指甲縫
鼻孔各有泥沙此乃乙劣而甲利其
衣服執於水而致死也一轉卽伏
洗冤集說云有兇徒謀死小童推入
水中發覺距行兇日已遠官司打撈
得之皮肉潰盡僅存骸骨不可辨驗
因雖招服未免疑其假合後因閱卷
見血屬所供其弟原是龜胸復檢果
然方敢定刑

死及被打後自縊身死被打後投水
身死之類須要見得親切若是打死
人後以藥灌入口中誣以自服毒藥
或死後用繩吊起假作生前自縊或
死後推在水中假作自投水者一有
差誤關係不小必須子細點檢死人
在身痕傷如果不是要害致命去處
其自縊投水及自服毒皆有確據實
跡方可明白開報

見證無人屍無下落

密訪是極難事或平日喜恃此策則訟師地棍必遣人妄布流言變亂黑白不可不慎說詳卷一檢驗總論內廣為訪察條上層

疑難檢驗毋使件作舞

近時案關人命重情如遇財勢之家一經地保帶同屍親稟報不必俟官吏臨場而刑件人等早被勾通打點此事全在司牧者胸有把握不至被其欺朦方能無枉無縱否則不論案之大小難易未有不墮其術中者余作吏二十餘年目中所見因此被黜者不知若干人矣

若昏夜被殺見證無人及屍無下落者只宜案候密訪不可妄意猜疑鍛鍊成獄

凡疑難檢驗及兩爭之家稍有勢力須選慣熟件作人謹慎守分者隨帶同行毋使暫離左右飲食水火令人監之少休以待其來不如是則恐其作私舞弊變動事情枉屈人命不可不慎

驗病死
人先問
因由

屍傷雜說

洗冤集錄云死屍肥壯無痕損不黃瘦不得作患病死凡屍有青色者雖係病死應將銀釵探試是否服毒注明屍格以杜日後刁告

凡驗病死之人須先問本人來自何處幾時到來有無熟人識認原患是何疾病年歲若干病幾日身死若是奴婢則先討契書看問有無親戚曾請是何醫人喫甚藥問明因由然後對眾證定如別無他故只取驗狀聲明遍身黃色骨瘦委是生前因患是何疾致死仍取醫人驗狀一紙如果

病死形狀

凡勞病死者形體瘦弱遍身皮肉黃白色氣膨食膨死者肚腹不堅硬按之則凹放手即高血膨死者當氣絕時即有黃水流腿脚腫脹

求乞病死

宋本蓋作著洗冤錄辨正上既云口合則不當復言唇不蓋齒言不著者

眾證因病身死分明既不是非理致死不須請復驗

凡因病死者形體羸瘦肉色痿黃口眼多合腹肚低陷兩眼通黃兩拳微握髮髻解脫身上或有新舊針灸癍痕餘無他故是因病死

凡患病求乞在路死者形體瘦弱肉色痿黃口眼合兩手微握口齒焦黃唇不蓋齒

病死發變

不過浮而相離之意

卷一驗屍篇有驗發變屍二條須參看

或疾病死。值春夏秋初。經隔兩三日。肚上臍下兩脅肋骨縫。有微青色。此是病人死後。經日變動。腹內穢污發作。攻注皮膚。致有此色。不是生前有他故。

邪魔中風卒死

涎壅卒死

此與下邪祟卒死相同。但分別內因。外因邪魔者。內因也。心神昏亂。似顛非顛。或目閉口呆。不省人事。由於氣血衰耗。元神不守。所致。非真有鬼邪附著也。邪祟者。外因也。若十挂五尸中惡客忤之類。由於感觸邪惡逆忤。臟氣所致。是實有鬼邪為患也。二者非不可救。但恐內外誤治耳。

邪魔中風卒死。屍多肥。肉色微黃。口眼合。頭髻緊。口內有涎沫。遍身無他故。

卒死。肌肉不陷。口鼻內有涎沫。面色

卒死者猝然僵仆死也其症有中陰中陽之別中於陰者面色青黑痰喘昏亂中於陽者面色紫赤上視強直此即真中風也

卒中死

肝風乘胃則口齒閉牙關緊急以皂莢乳香黃芪防風煎湯熏之然須大作湯液如蒸如霧乃得力風中經絡則口眼喎斜手足拳曲以桂枝三兩酒煎濃汁用舊布蘸搽數次患左搭右患右搭左尚可救十中一二

中暗風

死邪崇卒

此屬內虛暗風與外來風邪迥別肥人患此者多方書云中五藏之絡者口眼俱閉人肥必氣急而肺盛肺金尅肝木故痰涎流此當與前邪魔卒死條參看

暗風如發驚搐

虛風內煽必發驚搐中血脈則口眼喎斜中腑則手足枯細如此死者鼻

紫赤。蓋其人未死時涎壅於上。氣不

宣通故如此。

卒中死。眼開睛白。口齒閉。牙關緊閉。

有口眼喎斜。並口兩角鼻內涎沫流

出手腳拳曲。

中暗風。屍必肥。肉多渾白色。口眼皆

閉。涎唾流溢。卒死於邪崇。其屍不在

於肥瘦。兩手皆握。手足爪甲多青。或

暗風如發驚搐。死者口眼多喎斜。手

死

案十指甲俱青

足必拳縮。臂腿手足細小。涎沫亦流

出。

傷寒死

張仲景傷寒論云陽氣前絕陰氣後

傷寒死。遍身紫赤色。口眼開。有紫汗

氣後竭者其人死身色必赤

傷寒症血氣壅逆死後身色紫赤

流出。臂亦微綻。手不握拳。

冒時氣死

元稹本眼閉作眼開。舊鈔本同。應據

冒時氣死者。眼閉口開。遍身黃色。暑

改時行病。因天之風雨不時地之溼

有薄皮起。手足俱伸。

斑疹死

斑疹死者。兩眼合。十指甲青黑色。兩

斑疹死。皮肉上只有星點紅斑痕。而

不甚浮腫。

中暑死

中暑與傷暑異。傷暑者或坐臥陰涼

中暑死。多在五六月。眼合。舌與糞

為寒所襲。肢體拘急。嘔吐霍亂。此由

沈冤錄詳義

屍傷雜說

卷三

死

靜而得者也中暑者或遠行勞役大熱而湯陽氣內伏卒然昏暈此由動而得者也二者不可不辨

餓死

山東省萊陽縣民王四毆推頭發才落水受凍身死查王文進推跌發才才擦傷頭顱額角雖係致命之處原驗僅去浮皮傷甚輕淺不至於死賈發才爬起尚能叫罵後被王四推落水驚爬起躡立寒顫經王四扶回用火烤救旋即氣微殞命原驗屍身面帶芙蓉色口有涎沫兩手緊抱胸前其為落水受凍身死無疑將王四擬抵乾隆四十三年成案案禁即噤字緊禁者即緊閉也

驚死

門俱不出面黃白色亦有鼻孔及糞門有血出者

凍死者面色痿黃口內有涎沫牙齒

硬身直兩手緊抱胸前一說項縮腳拳檢時

用酒醋洗少得熱氣則兩腮紅面如

芙蓉色口有涎沫出其涎不黏

餓死者渾身黑瘦硬直眼閉口開牙

關緊禁臍肚低塌手足俱伸

驚死者目瞪口開兩手舒展猶若怕

酒食醉飽死

醉飽悶脹未死尚可救治當問其所傷何物卽用其物爲灰好酒灌下急覓消導之藥以導之如麪食積則以麪食燒灰多加炒焦麥芽飯食積則以飯食燒灰多加炒神麪肉食積則以肉食燒灰多加炒山查如係米麪肉食積而更雜以油膩則以米麪肉食共爲灰加以炒麥芽神麪山查好酒調灌外以生大黃末雜芒硝酒調敷其前後心及臍上再用艾灸三四壯得汗卽愈

元槩本如或作如因影宋本飲酒作服毒此段注語本係服毒篇正文列在服砒霜野葛之後意謂毒因吐瀉而變其狀似與服毒相反故申明其之說不知何以移作此注殊誤

肺之狀。凡驗酒食醉飽致死者先令伴作用醋湯洗檢在身如無痕損以手拍死人肚皮膨脹而響者卽是因食飽腹脹酒醉心肺致死仍取屍親供狀死人生前常喫酒多少致醉及現今喫酒多少數目以驗致死因由如或吐皮膚微黑不破裂口內無血面唇指甲不青糞門不腫突乃是飲酒相反狀

燒酒醉死

燒酒醉死用鍋蓋上氣水灌下半碗即活或以井底泥塗其胸浸髮冷水

中飲以綠豆粉可解

燒酒醉死者牙齒動搖欲落屍軟弱

不硬口鼻閒有血水流出○燒酒不

可以錫器盛炖及過宿倘為日稍久

飲之則能殺人其人之面多青黯

昔有人燒酒醉後復引烟而死者又有人醉燒酒身頗畏寒以綿被厚蓋之而死又有人醉燒酒索飲冷水數碗而死或日冷水徐飲可以漸引火毒外達若連飲過多熱毒為冷所遏無由透達故閉厥不收

凡酒食醉飽後被築踏內損死者其

醉飽後築踏內

貴州省饒連科先被張林才等毆傷小腹等處後被胡萬林嚇踢適傷饒

損死

連科臍肚下坐跌在地胡萬林順勢
推倒仆壓身上稱欲捆縛連科
醉飽被踢坐跌震動臟腑內損吐血
用藥醫治各傷將次不復惟臍肚下
之傷色仍紫赤且吐血不止延至三
十七日身死其為內損致死無疑嘉
慶二十一年成案

鍼灸死

此條語氣未了宋本致死因由下有
雖無意致殺亦須說顯是鍼灸殺亦
可科醫不應為罪二十一字刪去非
是

因其死之靜與躁以決其用鍼之誤
此非質之醫家難為誤用之證故上
節云須另勾醫人

靈樞素問載鍼灸刺中心一日死其

先志承羊氏

卷三

屍傷雜說

狀甚難明若屍別無他故惟口鼻糞

門有飲食并糞帶血流出驗此等屍

須子細體究曾與人交爭因而築踏

見證分明方可定狀一說其屍徧身微紅口眼俱開

兼有血出兩手握肚腹脹

鍼灸死者須另勾醫人驗鍼灸處是

否穴道有無錯誤致死因由

五臟之氣已絕於內而用鍼者反實

其外是謂重竭重竭必死其死也靜

動為噫刺中肺三日死其動為欬刺中肝五日死其動為語刺中脾十日死其動為吞刺中腎六日死其動為噦刺中膽一日半死其動為嘔刺中上中大脈血出不止死刺頭中腦戶人腦立死刺腎中太陰脈出血多立

陰竭必死
死則靜也

五臟之氣已絕於外而用鍼者反實

其內是謂逆厥逆厥必死其死也躁

臟氣已絕於外陽虛也反實其內誤補陰也助陰則陽氣愈竭故至四逆而厥逆厥必死死必躁也

男子作
過太多
脫死

相傳婦人脫死面作笑容玉門不開有粉紅精外溢柳子厚河間婦人傷所云髓竭而死是也

凡男子作過太多精氣耗盡脫死於婦人身上者真偽不可不察真則陽不衰偽者則痿

陰陽症死

陰症死

受杖死

陰陽症即張仲景傷寒論所稱陰陽易易者即交易之義男病而女與交接相染名陽易女病而男與交接相染名陰易男相染則陰腫八腹絞痛女相染則裏急腰膝連腹內痛此因淫情不禁陰邪得以投其隙移禍於不病之人頓令一身之精氣形神皆受慾火之害犯此症死者兩手足指甲青黯或青紫甚則頭面及遍身皆紫黯緣其血敗精脫故也

昔有人暈一婢而脫者斂時啟所蓋被異香四發此因服房藥多麝脂通透之品故也夢中脫死者男則陽不衰女則陰必洩屍俱有笑容

男女因陰陽症死者唇及指甲多青黯甚或遍身皆紫乃氣絕血凝之故陰症死者屍青黑黯似毒死形而色微淡口眼合兩手握陽縮小餘精流出

凡受杖而死者須驗所受杖處瘡痕

杖後因
他故死

古以荆杖決打小杖曰箠大杖曰杖
笞罪自一十至五十為五等杖罪自
六十至一百為五等今以竹板代之
每一十折責四板除零核算小竹板
大頭闊一寸五分小頭闊一寸大竹
板大頭闊二寸小頭闊一寸五分
竹板新者質重而棱角尚存責髻上
有如石壓舊者質輕而鋒芒都去責
雖重而迎髻即起早役受賄舞斃或
打用縮頭則傷聚一處血凝成瘡或
專打腿灣筋傷骨痠或將臂子挺起
打下則金閉頭闕
受杖之人忌臥草席及竹席並熱炕
不獨潰爛難痊且恐引毒入心或至

開狹看外腎并陰囊婦人并兩脅肋
腰小腹等處有無血癢痕

小杖痕左邊橫長三寸闊二寸五分
右邊橫長三寸五分闊三寸各深三
分

大杖痕左右各方圓三寸至三寸五
分各深三分各有膿水兼瘡周圍亦
有膿水淹浸皮肉潰爛去處

杖後有因他故死者若兩腿面及小

不救

受杖因
風身死

臨高跌
死

各項刑傷俱有生風變症不可不慎

腹有微紅色。勿以曾經受杖。更作血
瘡傷痕。蓋受杖時按捺在地。或被硬
物打傷。死後自然發現。臨時務須分
別。

兩臂上各有破傷。斜長幾寸。闊幾分。
深至骨。上有血痂。委是受杖決。因風
透患致命身死。

驗明失腳蹤跡及致跌因由并查抵
撞物件此乃受傷確證仍將抵撞之
物比對傷痕可攜取者帶回照庫不
能攜取者同照封記

凡從樹及屋臨高跌死者看枝柯挂
絆所在并屋高低失腳處蹤跡或土

痕高下及要害處。須有抵癰。或物磕擦痕。若內損致命者。口眼耳鼻內。定有血出。若傷重分明。更當細驗之。仍量撲落處高低丈尺。

自跌推
跌有別

自跌止傷半邊。推跌先傷頭面。洵屬不謬。若云自跌多在腿足。臂膊而竟不及頭面。推跌多在頭面。手腕而竟不及腿足。未必盡然。惟輕重有不同耳。全在臨時詳察。在上在下。不可執定。蓋被推而跌者。未必不自護其首。失足者亦未必不因他物磕撞。猝不及護。致傷頭面。且從高而下。或先上身倒落。則頭面安得不傷。

跌者從高而下。或失足。或自絆。其力在下。則所傷多在腿足及臂膊。然其或左或右。又皆止傷半邊。如係人推而跌者。則其力在上。所傷多在頭面及兩手腕。蓋推之力大。而人之一身。

塌壓死

江西省義甯州民段邦發從高自行
失跌身死驗得該屍致命頂心偏左
額角均有磕傷有血癰委係失足跌
傷身死嘉慶八年成案據此則錄中
所載從高失跌所傷多在腿足及臂
膊數語未便拘泥也

塌壓致死必有塌壓物件更須詳查
塌壓因由以防仇人謀害

各本瘀誤作淤據醫鈔本改說文瘀
積血也淤澁濁泥也此稱血瘀空
作瘀爲是

其最重莫如首推而下之勢必自顧。
或兩手先至地。或出於不知。則頭面
必先倒垂而下。雖亦未必全傷。而所
傷與自跌者不同。

凡被塌壓死者。兩眼突出。舌亦出。兩
手微握。遍身死血瘀紫黯色。或鼻有
血。或清水出。傷處有血癰赤腫。皮破
處四畔赤腫。或骨并筋皮斷折。壓著
要害致命。如不壓著要害不致死。或

舍屋及
墻倒石
落壓死

樹木壓
死

共擡一
物力小
壓傷

長闊分寸必與所壓之物比對相符
方無差患

若因傷致死腰間必有瘀血痕蓋擡
物全用腰力受傷必致血瘀

死後壓卽無此狀

凡舍屋及墻倒或石頭脫落壓死者
其屍沿身虛怯要害處若有痕損須
聲明長闊分寸作堅硬物壓痕仍看
骨損與不損若樹木壓死要看所倒
樹木斜傷著痕損分寸死後壓者亦
無此狀

兩人共擡一物一人力大驟爲擡起
一人力小被壓則所壓之肩窩及相

他物壓
塞口鼻
死

衣服溼
紙搭口

各本他誤作外據舊鈔本改

口鼻流血及便溺污可以洗滌掩飾
惟眼開睛突滿面血癰囊門突出諸
形狀斷難掩飾變混

凡用衣服悶壓死者猶有血癰痕跡
可驗如用溼紙搭口鼻死者面上並

先覓錄詳義

卷三

對之手足必俱有傷如誤觸而壓傷

者當辨其前後左右如被壓於後則

前有跌磕微傷被壓於前則後有跌

磕微傷左右亦然

凡他物壓塞口鼻出氣不得以致身

死者眼開睛突口鼻內流出清血水

滿面血癰赤黑色囊門突出及便溺

污衣服等件

凡被入衣服或溼紙搭口鼻死則腹

屍傷雜說

古

鼻死

他物壓塞死

穉穉捲
策倒立
死

無痕跡最為難辨須看手足心胸有乾脹。

無捉拏束縛傷痕細心查驗並詳訊

犯證要在落腔初供庶可得情稍一

疎忽便成疑獄
凡以石灰袋悶死者頂骨必裂碎以

紙或他物悶死者頂骨必紅色
此曾補上二條所未及須合參

腦後腳踝腳跟必有挺撞傷痕

被他物壓塞而死者其兩手外膊不

拘上下兩足後骨並心胸之前俱各

有微傷方是蓋悶至喘突壓之必重

身雖不能展動未有并手足壓定不

能稍動者如或并縛其手足則亦當

驗手足有無束縛傷痕

或有將人飲醉厚其穉穉挾令橫卧

俟其睡熟然後將穉穉捲而束之倒

死灰桶
倒入石

若止酒氣熏蒸安知非實係醉死故
又引讀律佩觿以申明之則與醉飽
死而脹在肚皮者不同矣

立片時卽死者並無口眼血出諸跡

卽或微有淨洗卽無而酒氣倍爲熏

蒸。一說大腹小腹皆平弱而無脹形

及心胸之前按之堅實擊之無聲者
卽是若檢骨則傷在頂心及兩足心

骨

有以高桶二隻疊而合之約如人身
之高下以下桶貯水令滿入石灰數
升攪渾將人倒入水中再以所合之
桶蓋上片時卽死名曰游湖其人死

既將人倒入水桶則死者手足應有
掙扎傷痕可驗否則有束縛痕

此等致死必有同謀多人但須供證
確鑿起鐵灰桶方可請檢否則一無
可疑之端豈得冒昧檢骨乎

後用水洗淨毫無傷跡面色微黃而
白一如病死雖云有血倒出然見灰
氣即回而血之應凝滯於面者得灰
盡解此若非檢骨則不得其實檢骨
之法必在腦殼之內蓋灰滓從口鼻
而入口鼻雖可淨洗而從鼻灌者直
入於腦灰最沈滯腦內必多灰滓以
此為驗自無所遁

硬物癰
疔死

疔平冤錄作贅云或作墊廣韻贅徒
念切支也據此疔為贅字之譌無疑

凡被硬物癰疔

音

死者肋後有癰疔

字音音苦瘧疾也與義未合

筋當從平冤錄作肋為是案上文既云肋後則此處係承上文而言應是肋字無疑且肋骨方是虛怯要害致命處設泛言筋骨便難直指矣

馬踏死

驢足牛角傷

著紫赤腫方圓三寸四寸許皮不破用手揣捏著筋骨傷損此為虛怯要害致命處

凡被馬踏死者屍色微黃兩手散頭髮不慢口鼻中多有血出痕黑色被踏要害處便死骨折腸臟出若只觸倒或踏不著要害處即有皮破癰赤黑痕不致死○驢足痕小牛角觸著處多在心頭胸前或在小腹脅肋若

人馬驢
驢牛踏
傷

青細漫筆云有人被馬踹踏受傷甚重或傳一方用鼠糞五十枚故馬韉一尺燒存性同研細末豬脂調敷數次愈

毛世洪便易經驗集馬齧傷潰爛以馬齒莧一握煎湯日服以愈為度傷口以籠頭繩索燒灰糝之即愈洗冤錄備攷馬蹠踏傷心腹兩肋小腹間長寬三四寸不等月芽樣半邊青紫半邊紅色一蹠可踏肋三條中一條損折有芒刺

驢驥不甚跳動故凝聚成形

皮不破傷亦赤腫牛角傷痕小而深者方是

人馬驢驥踏傷者有緩急叢亂之分

總以傷之多寡輕重為辨馬馳力大

所傷處少傷必骨折或腸臟出擁擠

仆地而踏傷必多但不似馳驟者之

力重而折甚人踏傷成片而長一頭

重一頭輕叢踏不起者則輕重長短

不一驢驥踏傷不獨較小於馬其傷

之暈凝聚成形牛觸係不知而驟撻

車輪擗死

集韻抄子末切通也各本从木作擗誤據舊本正

幾希錄方馬踏傷骨碎用生半夏二錢生黃柏二錢研末敷之再用鮮蟹殼新瓦上燒存性研末黃酒調服一醉其骨自合或用活蟹小者二三隻大者一隻攪爛熱酒沖服亦驗

者傷多在前兩肋之半小腹及心胸

若牛佚而奔方避之而不及則受傷

多在脊背及肋之左右

凡被車輪擗死者其屍肉色微黃口

眼開兩手微握頭髻緊速死者屍狀如此經數日

死者異是

凡車輪頭擗著處多在心頭胸前并

兩脅肋要害處便死不是要害不致

死

車有橫輦直輦之分

橫輦及面迎二者半由自取追給埋葬銀兩可也從背輦者辨其係曠野係城市係空車重車城市地窄人不及避空車可稍止以讓人重則人自應避之即酌輕重以定追埋杖懲之衡

車有橫輦直輦之分。橫輦者十字路口人從橫過。車行急驟不及挽回。其人跌仆被輦而死。則或項或首或心胸背脊肋腹或手膊腿足各有徑過傷。如係對面迎輦者。其傷或手足或脅肋。卻皆或左或右。俱在半邊。直而徑過其傷必長。卻多在仰面。若人在前行車從後至。傷亦如之。但屬在背居多。

雷震死

江西省寧都縣監生賴鼎被雷擊傷身死。驗得左額角擊傷一處皮破緊硬焦黑色。兩眼胞微開口。開手散爪。腹火燒象文一道。焦黃色髮散如燄。火燒焦腎囊微脹。穀道出血。周身黃黑色。乾隆四十一年成案。

雷有震擊分別

雷擊死者其形一如前條所載。惟震死者面色深黃帶黑黯而已。

凡被雷震死者。其屍肉色焦黃。渾身軟黑。兩手拳散。口開。眼皺。音脫皮剝也耳後髮際焦黃。頭髮披散。燒著處皮肉緊硬而攣縮。身上衣服燒爛。或不燒。傷損痕跡多在腦上及腦後。腦縫多開。鬢髮如燄火燒焦。從上至下。時有手掌大片浮皮紫赤。肉不損。胸項背膊上或有似篆文痕跡。○雷有震擊二項。震者被驚而死。無傷。擊則有傷。

虎齧死

毛世洪經驗便易方虎齧爪傷以蠶豆葉搗敷如無葉時以枯蠶豆水浸輒連皮搗爛敷之亦應

集韻羣柱買切讀與鴛近聲譜羣攬物也

虎齧傷不死用水調沙糖塗傷處或麻油塗或生薑汁拌白礬末敷均效

痕

衡陽人某被雷擊死身首俱無燒痕惟左足大指上如針刺一孔甚深自腳心起至膝上焦黃如灸亦無篆字文

凡被虎齧死者屍肉色黃口眼多開兩手拳握髮髻散亂糞出傷處多不齊整有舌舐齒齧痕跡

虎齧人多齧頭項上身上有爪痕羣

聲派上損痕傷處成窟或見骨心頭胸

前臀腿上有傷處地上有虎跡勒畫

仍飲薑汁解毒

死 顛狗傷

死 蛇蟲傷

顛狗咬人其傷處雖未破但見青紅
即已中毒宜亟治之被咬後用冷水
洗淨齒垢益以杏仁泥服韭菜汁一
碗以後隔七日一服服至七碗止此
症最怕七日一發發時即無風但畏
風大須人蒙護過三七日無此情狀
方吉百日內忌鹽醋一年內忌豬肉
魚腥終身弗食犬肉蠶蛹
讀律佩觿云黃風蛇倒東人身上以
尾入鼻竅不救無噉痕青色帶腫
方書蛇傷人用蜈蚣燒存性研敷又
焙研二條酒服

匠畫出虎跡并令刺甲及傷人處地
鄰為證。虎咬人月初咬頭項月中咬
腹背月終咬兩足貓咬鼠亦
然

凡被顛狗傷死者傷處必有痕跡腹
脹硬陰莖挺出其毒發之時如感冒
風寒之狀畏風特甚時作狗聲每欲
齧人及衣物小腹墜脹小便難
凡被蛇蟲傷致死者其被傷處微有
齧損黑痕四畔青腫有黃水流毒氣

死後被
蟲鼠傷

道路死
屍

元槩本洗冤集錄他物敲作狗咬

驗道路倒卧無主屍須看身上有無
灸癍疤瘡肉痛等項肢體有無舊損
皆要一一記明以防日後覆驗
驗報受傷路死及無傷而被禽犬殘
毀者要先看屍旁有無腳蹤血跡即
跟尋蹤跡由來並傷痕內齒痕禽啄
痕之類如有形跡即敘於件作喝報
之前或有屍親認領須訊明年貌衣
服並遺物是否相同設稍有未符不
得遽準給領以防垂涎遺物致被冒

灌注四肢身體光腫面黑。

死後被蟲鼠傷者皮破無血破處周
圍有齧痕蹤跡有皮肉不齊處若他
物敲則痕跡粗大。

道路死屍地方申報即行相驗明白。
開造有無傷痕約畧年紀填註面貌
衣服如有攜帶行李財帛眼同鄰甲
公驗貯庫以俟親人認領買棺殮封。
培土暫埋標立記號若係兇死之屍

附吞金身死

認

軍流遣犯病故向係將屍浮埋飭傳屍屬領骸歸葬乾隆四十五年刑部以浮埋之棺日久無人赴領轉致屍骸暴露行令就近深埋此等道路死屍其親屬赴領更遙遙無期應一體深埋以免日久暴露

雲督劉參革總兵田允中吞金斃命一案驗得屍身並無別項形狀用銀鍼探驗亦無青黑形色查田允中於初五日吞金戒指三個後精神恍惚不進飲食時索水飲于初八日口吐黃水不止即于是夜殞命檢驗驗說吞金死者其骨色黃

尤必斟酌申報

參附毒

烏沙脹

各項傷痕真偽易辨惟中毒一項有似毒而非毒者如傷寒陰症暗中風中毒之類各有青紫腫突形狀然猶有病情醫法可以查據至若誤中真毒如此論內所云參附癰腐食物蛇蟲等類全在相驗時詳察其平素之服食起居同伴之親友奴僕務得誤中毒氣確情庶免冤累若但以屍狀係是毒死銀鍊成獄則為害匪淺觀後服毒辨生前死後篇末節有中毒輒驗稱服毒宜子細辨之二語益當十分詳慎矣

沙脹死者面青色或身亦青色心坎兩肋有紫紅沙斑兩曲脈有青筋生前鍼刺無血出者十指甲青黯面青黑恐是中毒非盡沙脹也

論中毒

凡可以致人於死者非獨砒鴆為然而參附為尤甚。日夕服之不置以致口鼻流血膚為寸裂而死。岐黃書中更有青筋脹一症。即俗所謂烏沙脹。倘誤認為陰症而投之以藥則斷乎不收。凡此等症候及陰症之不救者。兩手足指甲皆青黯或盡青紫甚則頭面及遍身皆紫黯緣其血敗積而

閩粵瘡
癰治法

有宦游閩廣者云嘗見人感受瘴癘之氣百般療治迄無一效惟以吾鄉之長安臥龍丹及塘西妙藥丸其應如響因思此一丹一丸海內著名但近年市肆所售往往減輕貴藥而以賤藥足之以此功效稍遜於前余家遺有二方特錄於此凡有心濟世者誠能選料配合不特瘴癘可治而內外諸症百試百效此居家出外必備之藥也臥龍丹方麝香二錢梅花冰片四錢蟾酥二錢犀角肉桂水安息檀香沈香各五分子薄荷開楊花驚不食艸各壹錢牙皂二錢火硝五分燈艸炭六錢各研細末每藥秤準再合研極細養餉收貯不論何症臨時取少許嗅鼻得嚏即愈妙藥丸方茅山蒼朮六錢丁香大黃各壹兩二錢膽酥二錢麝香壹錢雄黃天麻朱

成色故也。又閩粵多瘴癘。凡為瘴癘所中之人。急令人以磁鋒代刺。或於額上。或於眉叢。或於兩臂膊。立出血升餘則瘥。病淺者血紅而多。病深者血紫而少。若紫黑而極少。則病甚深。乃倖而僅救者耳。土人每以得血稱賀。如或不得血。或得之艱澀。則咸知不治。及其死也。其屍頭面。或多青黯。或盡紫黑。其手足指甲亦然。又肺癰。

肺癰腸
風中臟
諸症

食物相
反

慎學瘡
癰身死
形狀

砂麻黃各八錢甘艸五錢各研細末以糯米粥漿和勻杵數千下丸如藟子大朱砂為衣晒乾蠶餅收貯內傷外感輕者七九重者十四九白湯送下外症照服并研末黃酒調敷中臟據舊鈔本作臘毒為是甘草與鮎魚黃瓜與花生南瓜與羊肉均不宜同食犯之立死物類如此者甚多

洗冤錄表云物性相反誤食而死須參看意外諸毒改變條

洗冤錄表云前言瘡癰死者頭面青黯此言亦有面色紅赤等語蓋補前條所未備也

腸風及中臟諸症未死之前吐出惡物或瀉下黑血穀道腫突或大腸突出等項豈可盡視為中毒之驗耶且如日用飲食中其物性相反誤食而死者更復不少即如生蔥不可見蜜河魷不可見弔灰之類苟因其死之暴而狐疑以推之則大謬矣

滇粵等省受瘡癰身死者頗多其屍不盡青紫黑黯亦有面色紅赤脣口

蟲蛇毒
物狂犬
等傷

中毒檢
骨

既有醫痕較前二節之中毒易辨

中毒檢骨有頭顱與下身仍然黃白者有牙根骨白色者蓋中毒有淺深久暫人有老少強弱未可一概論也惟胸骨十指尖骨或青黯或黑黯無

紫黑胸腹咽喉脹滿手足指甲俱青黯口眼耳鼻并糞門小便處所亦聞有血出若死後檢骨骨多青暈色毒有自外入而非飲食致者如蟲蛇等毒物傷則皮上有齧損痕若狂犬傷瘡乾後死亦有齒痕但分大小耳各所傷處但青黑腫

凡中毒屍骸潰爛檢骨則骨上下黯黑色胸腔心坎牙根十指尖骨俱青

不如此余歷大會檢經目睹即成
案亦不少非懸空凡說也
色。

服毒死
後形狀

凡服毒酒死者周身皮肉俱黑腹背俱發小炮七竅流血眼晴突出舌有芒刺肩吻碎裂十指甲青黑色肛門有血如將毒藥攪和食物服而死者周身皮肉青黑或紫黑腹背無炮七竅不盡出血舌無芒刺

驗服毒死者當究明毒自何來若自藥肆買致應問是否知情須查明有無餘剩毒藥並取驗盛藥器血以定虛實

耳鼻口內元藥本洗冤集錄作口鼻眼內平冤錄同

未死前
形狀

此節據元槩本洗冤集錄合上文爲一節平冤錄未死前句上有仍論究

服毒死

凡服毒死者口眼多開面紫黯或青色唇紫黑手足指甲俱青黯口眼耳鼻間有血出甚者遍身黑腫面作青黑色唇捲發炮舌縮或裂拆爛腫微出唇亦爛腫或裂拆指甲尖黑喉腹脹作黑色生炮身或青斑眼突耳鼻口內出紫黑血鬚髮浮亂

未死前須吐出惡物或瀉下黑血穀

三字

服毒發作

銀釵探法

驗水銀毒以金銀試探取出白色者是
諸毒俱可用銀釵試探惟服瀉及
衣灰水雖有銀釵試探不出
口內照朱本作喉內為是
洗碗錄備攷載廣濟縣有用蛇毒命
一案先將手足綑縛過令開口入蛇
頭用火燒蛇尾使蛇衝過咽喉盤攪

道腫突。或大腸突出。服毒多而速死。者形狀始有此。凡服毒死。或即時發作。或當日早晚。若其藥慢。或一日二日方發。或翻吐。或吐不絕。仍須於衣服上尋餘藥。及死者坐處尋藥物器皿之類。

驗服毒用銀釵皁角水揩洗過。探入死人口內。以紙密封。良久取出。作青黑色。再用皁角水探洗。其色不去。如無其色。鮮白。人既死。雖非服毒。未免有穢。故銀釵亦作黑色。

糯米飯
放屍口
驗法

五內初相驗時毫無傷痕即銀釵探試亦無青黑色惟檢骨可得其情此骨從頂至足周身四旁凡一尺一寸之骨俱紅赤色鮮潤明亮將骨細刮愈刮愈紅是由蛇入腹攪亂周身血髓悉行透溢各處骨道故耳案洗冤錄表云查用蛇毒命既須先縛手足則手足定有細縛痕且逼令開口定有他物撬傷牙齦去處及有按住兩頤提勒髮辮種種痕跡可驗

袋當依元藥本洗冤集錄及平冤錄作袱為是庶下袱字方有根
蒸元藥本洗冤集錄作饋平冤錄同注云饋甫文切音分牛蒸也案劉熙釋名饋分也眾粒各自分也
元藥本細破作打破

但洗之即去也惟真中毒雖洗數次其色青黑不能鮮白

案毒藥身死者事多曖昧全憑銀釵定驗虛實銀釵似偽一觸穢氣其色即變難以辨明若臨事取辦於民則情弊多端必須令工匠用足色銀成造以官對牌試驗鑒記封收專為驗屍需用亦絕冤濫之一端也

又一法用大米或黏米三升炊飯用淨糯米一升淘洗訖用布袋盛就所炊飯上炊蒸取雞子一個鳴子亦可細破取白拌糯米飯令勻依前袱起著在

用縣絮至三五條未免過多以三五條之絮而欲以三五升之醋煮覆則醱醋又嫌過少二者必有一誤須臨時斟酌

前大米黏米飯上以手三指緊握糯米飯如雞子大毋令冷急開屍口齒外放著及用小紙三五張搭遮屍口耳鼻臂陰門之處仍用新縣絮三五條音念醱醋三五升用猛火煎數沸則縣絮放醋鍋內煮半時取出仍用糟盤罨屍卻將縣絮蓋覆若是死人生前被毒其屍卽腫脹口內黑臭惡汁自然噴來縣絮上不可近後除去縣

飯入屍口取與雞喫驗法

空腹食飽虛弱老病服毒形狀不同

廣東省開平縣民婦許氏毒死親夫李宜滿一案據覆檢件作供稱李宜滿食存胸膈毒不復行是以項頸胸膛骨色青黯而頭顱與下身各骨仍然黃白九卿會驗此屬臆揣之詞並無確證嗣據禮部尚書王安國奏李宜滿項頸並胸膛骨青黯不得謂非中毒所致照罪疑惟輕將許氏斬決

絮糯米飯被臭惡之汁亦黑色而臭。此是受毒藥之狀如無則非也。又一法將白飯一塊入死人口中喉內用紙蓋一兩時辰取出飯與雞喫雞亦死卽是。

有空腹服毒惟腹肚青脹而脣指甲不青者有食飽後服毒惟脣指甲青而腹肚不青者又有腹臟虛弱老病之人畧服毒而便死腹肚口脣指甲

乾隆十二年成案

糟醋罨
法

並不青者。卻須參以他症。驗虛弱老

銀釵探喉中。如果色變。還作服毒論。其後方以他症參之。須詳審此人未死。前有何病。症虛損等情。

有服毒已久。蘊積在內。試驗不出者。

須先以銀釵探入死人喉訖。卻用熱

糟醋。自上而下。洗漸漸向上。須令氣透。

其毒氣熏蒸。黑色始見。如便將熱糟

醋。自上而下。則其熱氣逼毒氣向下。

不復可見。或就糞門上試探。則用糟

契物壓
毒入腸
驗法

生前中
毒驗法

平冤錄云本屍唇破舌爛口內紫黑
手指甲青以銀釵探入喉中少時取
出其釵黑色是生前中毒身死
無冤錄云凡服毒死屍口眼多開面
紫黯或青色唇紫黑手足指甲俱青
黯口眼耳鼻間有血出中毒亦然
朱本其骨黯黑色作鑿色說文鑿淺
青黑也七感切

醋當反是

服毒中毒若生前喫物壓下入腸臟
內試驗無證即自穀道內試其色即
見

服毒辨生前死後

生前中毒遍身作青黑多日而皮肉
尚有亦作黑色若經久皮肉腐爛見
骨其骨黯黑色胸膛心坎牙根十指
尖俱青色

死後假
作中毒
驗法

中毒稱
服毒宜
細辨

死後將毒藥置口內。假作中毒。皮肉
與骨。只作黃白色。

有本是中毒。輒驗稱服毒者。宜子細
辨之。

蠱毒

凡頭面有光他人手近之如火熾者此中蠱也用蒜汁半兩和酒服之當

吐出如蛇狀即愈

中蠱毒即取蠱相制之蠱蠱曝乾燒

灰服少許立愈如知是蛇蠱用蜈蚣

蠱蠱蜈蚣蠱用蝦蟇蠱蠱蜈蚣蠱用

蛇蠱蠱之類

粵中名藥鬼又名挑生凡室中無塵

網者必有藥鬼

刑律造畜蠱毒殺人條云凡置造藏

畜蠱毒堪以殺人及教令人造畜者

斬不問已未殺人財產入官妻子及

同居家口雖不知情並流二千里安

置教令者之財產妻子等不在此限

若以蠱毒毒同居人共被毒之人父

母妻妾子孫不知造蠱情者不在流

諸毒

中蠱毒者偏身上下頭面胸心並深

青黑色肚脹或口內吐血或糞門瀉

血。

造蠱者取百蟲置皿中經年開

視有一蟲盡食諸蟲而獨存者

爲蠱故字從蟲從皿也能隱形

似鬼神其毒不一皆變亂元氣

多因飲

食行之

南方有蠱毒之鄉於他家飲食

卽以犀角攪之白沫竦起卽爲

有毒無沫者卽無毒令病人吐

於水內沈者是蠱浮者卽非或

遠之限若係知情雖被毒仍緣坐

金蠶

馮氏醫說蠶類不一有魚蠶雞蠶鵲蠶羊蠶牛蠶大蠶蜈蚣蠶蜘蛛蠶蜥蠶蛇蠶蠅科斗蠶馬蠶蠅蠶小兒蠶等惟以金蠶蠶為最烈被其毒者嚼白藜反甜生黃豆不腫以升麻鬱金各二錢煎服不吐即瀉立愈嶺南雜記雷州有挑生蠶凡喫雞魚瓜果皆可挑初中毒覺心腹作痛滿十日則內物能動治法毒在上焦用熱茶投膽礬五分候礬化呷服良久以雞翎探喉中即吐出如在中焦以米飲下鬱金末二錢即瀉出述異記石門沈心庄任閒化時偶坐晚堂見一物其光如詩詢之胥役云此蛇蠶也亦名飛蠶每於夜間飛出下食人腦故開化居民時屑黃昏不

令含黑豆豆脹皮脫者是蠶豆不脹皮不脫者即非

中、金、蠶、蠶、毒、死、屍、瘦、劣、徧、身、黃、白、色、

眼睛塌口齒露出上下脣縮腹肚塌

將銀釵驗作黃浪色用阜角水洗不

去金蠶蠶毒之巧者服之而死與病死者無異但銀釵上黃浪色洗之

不去此金又有身體脹皮肉似湯火

炮起漸次為膿舌頭脣鼻皆破裂乃

是中金蠶毒之狀上言瘦人此言肥人

金蠶一名食錦蟲蟲屈如指環食故緋帛錦如蠶之食葉滇蜀

鼠莽草

敢露坐巢氏病源中蛇蠱毒心腹熱
悶胸脅支滿舌本脹強不喜言語面
赤唇焦又心腹閉如有蟲行經年不
治肝膈爛而死崔行功纂要以馬兜
鈴一兩煎服即吐出

問小記聞有蠅蠱蠱每至庚辛申酉
日則蠱神下糞如白鳥矢取以膏人
或入飲食中或彈衣領內中共膏者
必先一噓則蠱入百節五臟矣治法
用車轄脂半斤漸漸服之即出
五岳游艸一種稻田蠱胃中生土一
塊內生稻芒刺心而死

安徽省婺源縣民李獻與俞氏通姦
口角俞氏潛往山塢采服鼠莽草越
三日殞命驗止唇吻青色起胞並無
唇裂齒齦青黑出血諸狀即駁覆勘
歷經究審實係中毒等語查鼠莽草
有二種一係木本一係藤本其質既

湖廣間粵皆有奸人畜之取其
糞置飲食中毒人人即死蠱得
所欲則日置他財使人暴富然
遣之極難水火兵刃都不能害
必倍其所致金銀錦物置蠱於
中投之路旁人偶收之蠱隨以
往謂之嫁金蠱不然入人
腹殘齧腸胃完而後出也
粵西有藥思蠱狀似龍雞蟲如
蠶豆大能變幻作小孩形遣嫁
之法仿
佛金蠱

中鼠莽草毒江西南有之亦類中蠱毒
加之唇裂齒齦青黑色此毒經一宿
一日方見九竅有血出

有不同其性未必無異况春夏盛長之時其毒必深重若遇秋冬凋落僅存枯梗其毒必然輕減見成案急救方解鼠莽毒用黑豆汁或枯蓮房帶蒂梗煎水灌之

莽草本作网人以毒鼠故名鼠莽食之令人迷罔南中川蜀以及上谷皆有之木若石楠葉稀無花一說藤生繞石間是名网草

巴豆毒

中巴豆毒用芭蕉根葉搗汁服之痢止而安或飲以新汲水亦效

中巴豆毒口乾兩臉赤五心煩熱痢

不止

砒霜毒

山東省荷澤縣民婦張謝氏與王有通姦砒毒親夫張僧致死原驗官開棺驗屍口眼俱閉身白無血肚腹指尖青微青疑為屍身發變據供以病死詳報覆檢身根骨心坎骨十指尖骨俱青黑色其餘骨殖俱黯黑色委係受毒身死乾隆四十五年成案

中砒霜毒得一伏時遍身發小炮作

青黑色眼睛聳出舌上生小刺炮綻

出口脣破裂兩目脹大腹肚膨脹糞

門脹綻十指甲青黑

鉤吻毒

湖北省漢陽縣民婦姚徐氏與劉長通姦用砒毒死親夫姚大訊明將砒霜放入茶內喫後只叫心燒腹痛尙能飲食越至十日始發狂身死因係砒霜底子不甚醃烈且原喫不多是以發毒甚遲驗得唇紫胸青骨黑黯色實係受毒身死見成案

直隸省安平縣民陸二梅與李從泰之妻紀氏通姦起意商謀致死本夫將信毒入麵做成火燒李從泰取食一枚旋即毒發越八日殞命乾隆五年成案

浙江省松陽縣民詹廷華因葉長森姦佔其妻王氏遂服紅砒二錢延至八日殞命查紅砒卽砒石未煉成霜其毒稍輕見成案

折獄龜鑑王琰知福州時聞人欲報讎先食野葛而後鬪卽死其家遂經

中、砒霜毒吐逆腸腹絞痛不可忍發狂七竅迸血口唇亦青黑色若飽時服上一半青饑時服下一半青外腎脹大。

砒石出信州玉山有砒井故亦名信又隱信字爲人言此井官封禁取甚嚴然他處出銅錫之山往往有之生者名砒黃赤色青緩以火煉之令烟上著器凝結作白霜者名砒霜毒尤熱烈若過酒及燒酒尤腐爛腸胃頃刻殺人

中、鉤吻毒百竅流血狀與砒霜畧同。

告之臻訊得其寶懲誅告者寶昌齡
為儆州浮梁尉其俗輕死與人無怨
往往食野葛以誣怨者昌齡能辨究
之

中鉤吻毒口不開者急以大竹筒通
節以頭挂兩脇及臍灌冷水入甬中
數次口便開多服人糞汁或斷鷲鴨
頭瀝血入口灌之

冰片毒

急救方中冰片毒飲以新汲冷水可
解

水銀毒

未信編昔文信國服冰片自戕而無
害以未飲酒故也冰片切忌入酒
毛氏經驗方中水銀毒飲地漿水立
愈其法掘地成坑以水傾注攪成泥
水謂之地漿

果實金石藥毒

鉤吻即野葛因入口鉤人喉吻
故曰鉤吻廣人謂之胡蔓草又
日斷腸草滇人謂之火把花岳
州謂之黃藤其草近人則葉動
蔓生葉圓而光春夏苗嫩毒甚
秋冬草枯稍緩五六月開花似
檉柳花數十朵作穗
嶺南花黃滇南花紅
中冰片毒熱酒服冰片錢許則正氣
散亂血脈沸騰七竅流血而死
中水銀毒身死者以黃金驗之色白
者是

食果實金石藥毒者其屍上下或有

赤腫平冤錄作青腫

酒毒

酒性最烈不宜近火如須熱飲必以重湯炖之而燒酒為尤甚犯此者陰受其害而不覺也

藥毒菌

蘇臺記略宋時天平山白雲寺有五僧偕行山間見一草甚大采而食之至夜嘔吐不止三人急采驚驚草生

銀鋤毒

草即俗稱金銀花也
鋤方書作銷案鋤銷二字字書俱無當即袖字集韻物有光也

中銀鋤毒頗門偏左偏右脊背肋骨俱紅色或起霉斑兩肩兩臂兩腿骨

一二處赤腫有類拳手傷痕或成大

片青黑色爪甲黑身體肉縫微有血

或腹脹或瀉血

中酒毒腹脹或吐瀉血

中藥毒菌音郡草音淨毒手腳指甲及身

上青黑色口鼻內多出血皮肉多裂

舌與糞門皆露出

服銀鋤死檢驗傷痕法各書中俱無

載

絡或為毒氣攻成蜂窩樣

中銀鋤毒服黃泥水一盤即愈又方

每日用飴餅四兩熬成小丸不時以

真芝麻油送下亦效

張氏驗方解銀鋤毒將帶皮綠柿連

喫十數枚自愈冬月喫柿餅

服鹽滷死

服滷死者面色黃周身皮發亮黃色

口鼻內涎沫流出嘗之必鹹肚腹低

陷十指甲黃或青黯色滿身經絡俱

收縮如服滷太多皮肉俱青與毒相

似或面色微紫赤唇吻皮皺牙眼微

紅色舌縮微有小蛇

案銀鋤性主腐爛皮肉今人每

用以去痣此物投入腸胃非比

砒藥諸毒性烈服之即口眼鼻

竅流血唇齒齦裂裂指甲青黑現

有外傷可以檢驗係黏入腸胃

漸漸腐爛令人如患病狀或半

月一月而死卻無外現傷形又

金銀圓光無鋒芒者入腹可下

若剪碎尖稜鉤住腸胃能令人

斷腸而死亦無外傷可以檢驗

此種人命既無檢驗之法

姑闕疑以俟畱心體察

服鹽滷死者髮亂手指甲禿胸前有

爪傷痕因痛極不可忍徧地滾跌自

抓掐音却所致

服灰汁
死

莨菪毒

余官平度驗服酒身死者一年壯婦人面色黃亮周身及十指甲俱黃色喉下抓破浮皮數點一年老人面色微黃口流涎沫十指甲青黯色毛氏經驗方凡服鹽酒急先灌米泔水數碗再以活雞鴨一兩隻斷去頭塞於口中以熱血灌下即解

本州莨菪一名天仙子一名行唐其子服之令人狂放蕩故名金匱要

服酒死者身不發炮口不破裂腹不膨脹指甲不青釵探不黑頗有黯色洗之即白徧身黃兩眼合口中或有涎沫但其屍雖發變心肺不爛取汁煎之猶能成鹽

服澣衣所用灰汁死者有乘人病時以灰汁煎藥毒之致死者髮亂指甲秃身拳曲口鼻有血

中莨音郎菪音蕩毒悶亂如卒中風或似

苦杏仁
毒

略其荳葉圓而光有毒誤食令人狂
亂甘州汁解之
生食亦能死人故市買杏仁須用清
水浸泡泡出之水令犬食之立斃
服杏仁死者周身皮及指甲俱黃色
見山西省成案
中杏仁毒急取杏樹皮煎湯服之雖
迷亂將死者亦可救

草烏頭
毒

本州州烏頭亦名烏喙野生狀類川
烏有大毒熬膏名射罔傳箭射獸見
血立死

熱盛狂病。一名水荳荳葉圓而光誤食令人狂亂或吐血

中苦杏仁毒西北諸省有苦杏仁生

熟服之都不為害畧用火炒仍令半

生服數十粒即能死人其屍眼閉舌

脣耳竅手足十指俱青色肚腹有青

色塊。每有食以詐人者人不易防最難禁化惟急取吐吐出可解

中草烏頭毒江左山南有草烏頭其

汁煎之名射罔俱大有熱毒而射罔

更烈塗破傷損處立能殺人

鵩鳥毒

此條自南海以下至末各本列為小注今以上文中苦杏仁毒及中州鳥頭毒兩條例之一則西北諸省云云一則江左山南云云則此處南海云云明是正文無疑否則僅此中鵩鳥毒四字語氣未了且於上文亦不類因此改正

鵩各本為鵩據廣志改

說文鵩鳥也玉篇鵩羽畫酒飲之即死

中鵩毒氣欲絕者用乾葛末井水調服三盞即愈口噤者灌之

浙江省仁和縣民祝永林服鵩酥一錢五分嘔吐發顛滿面大汗頓倒在

附服鵩酥

地身死驗得面色微青兩眼閉鼻竅血水流上下唇吻翻牙齦黑口閉舌起胞爛咽喉連食氣喉微腫肚腹平陷十指甲青黯色穀道糞出乾隆

中鵩鳥毒南海有鵩鳥似鷹而大狀如鵩紫黑色赤喙黑目頸長七八寸雄名運日雌名陰諧食蛇及橡實蛇入口即爛其屎溺著石石皆黃爛飲水起百蟲吸之皆死巢於大木之顛其下數十步艸不生人誤食其肉立死惟得犀角其毒即解

四十九年成案登本州戰塘酥即舊
墓窟開白汁辛溫大毒能爛人肌肉
惟疥瘡合他藥服一二釐取其以毒
攻毒

服官粉毒

服輕粉毒

河南省中牟縣民婦劉張氏被李進
強姦致令羞忿服官粉中毒身死驗
得張氏上下唇吻皆上下牙齒青十
指甲青委係中毒所致據仵作周大
聲稱洗冤錄雖無服官粉中毒一條
但官粉俗稱鉛粉是黑鉛燒成自然
有毒今驗唇吻牙齒指甲俱青色實
係中毒無疑乾隆十八年成案
江西省石城縣溫張氏與溫子勝通
姦用輕粉謀毒本夫溫名勝身死查
輕粉乃水銀加以鹽礬用火煨鍊而
成輕揚燥烈毒氣善竄經絡筋骨服
多者毒重唇吻牙齒指甲俱青服少
者毒輕僅現於龜子骨見成案

服鳴精
神

江西省石城縣捕役黃和莊通張甫
瑞服鳴精州中毒身死檢得兩服脛
骨兩十指尖骨俱青色十趾甲骨俱
黑色委係服毒身死乾隆四十三年
成案

食 莧鼈并

物類相感志鼈同莧菜食生血鼈
物理小識以赤莧和鼈剝成小塊厚
以茅包經旬即化為鼈舉投河中數
月可食吳人謂之種鼈

驢肉荆
芥并食

舊本驢肉作黃魚據注以黃魚為是
但驢肉與荆芥相反宜兩存之
谿澗中石斑小魚亦與荆芥反

意外諸毒

莧鼈并食毒

昔有人將鼈與莧并食之遂病
死屍未殮忽小鼈無數自九竅
湧出散走馬廐中惟遇馬溺者
輒化為水又有人誤食鼈莧飲
馬溺得瘥或云
白馬溺尤良

食驢肉喫荆芥茶殺人

本艸昔有人喫黃魚羹罷採荆
芥和茶而飲少頃足底奇癢上
徹心肺跳行沙中馳走如狂足
皮皆破欲裂急求解毒藥餌之
兩日乃止○荆芥一名假蘇本
艸謂性溫不然實微涼數見食

漏滴肉

方書茅屋漏下沾著肉上名漏滴中其毒者燒犬糞酒調服

茅舍漏滴肉上食之殺人

蜜鮮并食

養生雜記鮮與青小豆同食殺人食物本州諸鮮不可合生胡荽葵菜麥醬蜂蜜食令人霍亂多死

蜜鮮并食毒

韶州月華寺側民家設僧供新蜜方熟羣僧飽之有某院長老兩人還至半道遇村墟賣魚買食盡半斤至夕皆死

藥後食河魴

河魴毒在肝血脂子并眼尤忌塵煤落人

河魴風藥并食毒

食物禁

輟耕錄云中河魴毒用槐花微炒與乾燕脂各等分同擣水調灌妙風藥如荊芥之類河魴與荊芥相反并食必死洗冤錄筆食物變改禁忌凡錄中所未詳者攷諸載籍分類摘錄以備參

昔有人招友晨餐者烹河魴為饌友以故不食遺歸鮓妻妻方平明服藥不以為慮毀之甚美即時口鼻流血而絕食物變改及食禁○按禽獸蟲魚之

稽如雞四距六趾黑身白頭鴨目白
黑身白頭或五色元鳥白首鳥足不
伸則有八字此羽族變改也羊六角
心有孔白羊黑頭黑羊白頭豕白鬣
青爪心肝有孔黑牛白頭白馬黑頭
六畜自死口不閉首北向肉多黑星
此獸族變改也魚無腮目能開合腦
中連珠鮎魚赤目赤鬚鰻魚腹有黑
斑鰕無鬚煮熟不縛鰓目白目陷獨
目赤足無裙頭足不縮腹下有蛇文
有三字天字卜字小字領下有軟骨
如龜形蟹獨目目赤兩目相向腹斑
腹中有骨背有星點此水族變改也
其餘禁忌備列於後

各木腎色作腎氣據舊鈔本改

余家於數年前剖一鮑無腸膽并無
血惟有一物似帶蟠屈其中引之長

屬。或有感。沴氣所生。形質變異者。如
獸有歧尾。蟹有獨螯。羊一角。雞四足
是也。○物有形。色變異者。如白鳥烏
首。烏雞白首。白馬青蹠。白馬黑蹠。是
也。○有形。色無異。其肉變怪者。如落
地不沾灰塵。經宿肉體尙暖。曝炙不
燥。入水自動之類是也。○有皮肉無
異。腸臟變改者。如肝色青。黯。腎色紫
黑。魚無腸膽。牛肝葉孤之類是也。○

丈許因棄不食

洗冤贅華凡食物禁忌如雞肉忌橘
 皮合糯米食生小蟲合兔肉食發虛
 黃雞卵合鰲與莧菜食生血驚鴨肉
 忌薄荷野雞忌蕎麥木耳合鮓魚食
 令人生癰鵝肉合榧子食生癰節風
 此羽族禁忌也羊內忌牛夏合南瓜
 食殺人羊肝合筍食令目盲豬肉合
 蕎麥羊肉食脫髮眉豬心肺合吳茱
 萸食發痔疾牛肝忌鮎魚馬肉忌蒼
 耳大肉忌商陸合蕩食令人生癰兔
 肉合芥菜食成惡疾此獸族禁忌也
 鯽魚合天門冬食生水腫合麥醬食
 生喉瘡鰻魚合銀杏食生風黃魚
 忌蕎麥鯽魚忌大肉蛤忌米醋此水
 族禁忌也其他桃李雙仁瓜有二蒂
 王瓜花生同食斷腸之類難以悉數
 養生家不可不察也

有一物常食性善與他物相反過口

而害人者如鮓魚同鹿肉食之殺人

羊肉同鱸酪食之害人羊肝得生椒

破人臟豬肉得胡荽雖音爛人臍是也

○有一物常食性平與他物相感入

腹成動物者如鮓生同酥乳食之變

諸蟲鰲肉與莧菜食之還生鰲牛肉

同豬肉食之成寸白蟲豬羊肉以桑

楮柴煮炙食之亦成寸白蟲也

蛇遺水

張氏驗方誤服蛇遺水用甘州煎湯灌下吐十餘次自愈

隔宿茶水恐亦有毒蟲所遺不淨皆當慎之

餅花水

洗冤集編云餅中花水凡有色可愛香可嗅者除薑花外俱毒不可飲其味辛故中毒死者口微開不閉

飲蛇遺水毒

湖州陳某因步春渴掬淵水咽之數日覺心腹微痛日久疼甚醫診之云心脾受毒今心脈損甚陳語其故醫曰蛇遺不淨在淵子誤飲其水蛇已成形在腹食心而痛也遂以水調雄黃服之果下赤蛇數條皆能行

飲餅花水毒

宋汪待舉字懷中守處州郡部民有飲客者客醉臥於空室中夜醒酒渴索漿不得乃取花餅水飲之次早啟戶客死矣其家訟於官待舉究舍宇所有物惟餅浸旱蓮而已細鞫之訟乃白

三足蟹

洗冤錄附考蜀人買得蟹十數枚痛飲大嚼且食红柿至夜忽大吐繼之以血昏不知人病垂殆同邸有知其故者憂之忽一道人云惟木香可解但深夜無此偶有木香餅子試用之病人口已噤遂調灌即漸甦吐定而愈

艸藥

不獨艸藥為然即園圃菜蔬亦當揀淨而食不致有誤
自來醫家開方於柴胡上必加一淨字詢之醫士茫然不知偶遇一貨藥者云斷腸艸往往與柴胡並生采取時必得揀淨方可入藥正藥且然何

○一云餅
浸蠟梅

食三足蟹毒

太倉州民道見漁者持一蟹而三足買歸令婦食之既熟呼婦共食婦不欲食出坐門外久不聞其夫聲入視已失所在地上止存髮一縷衣服冠履事皆在如蛻形者驚怖號喚里甲以婦為謀殺夫而詐誣也官為鞠之得其情乃原婦罪

艸藥夾雜毒

英州僧某往州南三十里掃塔有客船自番禺至舟中士人攜一僕僕病脚弱不能行舟師憫之口舌有一藥治此病如神既

況艸藥

食魚投
荊花

秋鎧餘話載王阮亭尚書過濟甯有
友邀飲正荊花盛開卽布席庭中阮
亭距荊花丈許一客纔二尺餘野人
以鯉魚進阮亭素不嗜魚置不食客
與主人甚笑未幾俱作嘔遂致殞命
次日方知魚與荊花相反也

食物過荊林毒

賽廟畢飲胙頗醉乃入山求藥
漬酒授病者其藥入口腸胃卽
痛如刀割遲明而死士人咎舟
師舟師恚卽取所餘藥自漬酒
服之不踰時亦死蓋山多斷腸
艸人食之輒死而舟師所取藥
爲根蔓所纏結醉不暇擇徑投
酒中是以及於禍則知艸藥不
可妄服也

單縣有田作者其婦餉之食畢
死翁姑曰婦意也陳於官不勝
筆楚遂誣服是時天久不雨許
某時官山東曰獄其有冤乎乃
親歷其地出獄囚徧審之至餉
婦乃曰夫婦相守人之至願鳩

老雞

張氏驗方解老雞毒犀角并水磨汁服屢試極驗

雞毒

毒殺人計之至密者也焉有自
餉於田而鳩之者哉遂詢其所
饋飲食所經道路婦曰魚湯米
飯度自荆林無他異也許乃買
魚作飯投荆花於中試之狗斃
無不死者婦冤遂白即日大雨
注如

昔有蘇人出商於外其妻畜雞
以待其歸數年方反殺雞食之
夫即死鄰人疑有外姦首之太
守鞠之無他故後細察其由獄
遂白蓋雞食蜈蚣百蟲久則畜
毒食之殺人故養生家雞老不
食又夏
不食雞

黃蠟炒

既服悶氣塞斷不死如平人矣故凡
內補出屍狀并檢驗之法
洗冤彙編云黃蠟人雞炒其味最美
食之氣塞腹脹死明劉誠意飲於胡
惟庸家歸而腹中如有拳石築塞而
死其即此之類也

黃蠟炒雞人食之脹悶氣塞三日而
死他毒可驗此毒死如平人絕無可
驗亦無可救法

考辟穀諸方每有用黃蠟者云
食之不飢必須解下然後可喫
他物解之之法用青菜湯或冬
葵子湯飲一二碗藥即解下依
然未化也若未解時止可飲清
水凡有質有味者俱不可食食
之必甚脹滿然則黃蠟炒雞之
毒或亦前物可解乎或麻油大
麻子汁葵菜湯菠菱菜湯亦可
解乎又黃蠟能飲氣不散故凡
丸藥之珍貴者以蠟裹之可久
貯不壞今中此毒者口鼻等竅

此條出智囊原本令異之下有召此婦而烹焉出死囚與食便稱腹痛俄仆地死十九字洗冤錄辨正云此謂其人性嗜鱻因妻烹鱻啖後腹痛而死縣令疑中鱻毒乃以鱻數百斤置水中見有昂頭出水者已覺其異必仍令其婦烹食死囚而驗方得實據然後定獄若僅以鱻昂頭為異而無烹食一層即無實據矣此十九字如何可刪

鱻毒

自當無血水流但既脹悶而死必有眼凸臍凸糞門凸腹膨脹等狀可驗或屍已腐當視其腸胃必有蠟雞未化似宜取出洗去他穢以水煎之蠟浮水面候冷自凝成片仍作黃色此亦似屬可驗者乎

鉛山縣有賣薪者性嗜鱻一日自市歸飢甚妻烹鱻以進恣啖之腹痛而死鄰保謂妻毒夫執送官拷訊無據械繫踰年縣令閱其牘疑中鱻毒召漁者捕鱻得數百斤悉置水甕中有昂頭出水二三寸者數之得七令異之知為他物所變其毒必甚細

守宮

說文云在壁曰蜺蜺在艸曰蜺蜺本
艸綱目蜺蜺即守宮也一名辟宮一
名壁虎一名蝎虎以善捕蝎蜺故得
虎名博物志守宮以鬻養之食以朱
砂體盡赤擣以點女人臂終身不滅
淫則點滅故謂之守宮吾鄉又謂之
潛龍

暑衣

中暑類傷寒故善醫者必問病原驗
屍者亦當推鞠因由

沈氏尊生書云夏月曝書曝衣暑氣
未散隨即收藏至秋冬近之其氣亦
從口鼻而入而即發此暑毒伏于
物而觸于人者也其病或霍亂吐瀉
或洩痢腹痛或癰發寒熱皆當細詢
其因以為治甚或有身熱足冷者其

守宮毒

為鞠究婦
冤始白

驚蟄後至九月凡茶水在几上
經宿者雖渴甚不可飲因守宮
之性見水則淫每於水內相交
餘瀝遺入為性最毒如誤飲時
急覓地漿水解之或吐
或瀉尚可拯救一二

衣有暑毒

夏日汗透衣切不可於烈日中
曬若將乾忽暴雨將至急為收
納則烈日之毒即錮於內如遇
酷暑汗出時偶一衣之則暑以
引暑其毒立中證候全類傷寒
若誤作寒治必至發狂譫語再

勢則甚危矣

冬月且中暑毒可見夏日曬衣尤不宜驟為收藏

空屋邪氣

巴蜀志異明彭將軍征寇入蜀偶過一禪院規模宏敞詢之土人云已百年無僧彭慮有伏寇率兵而入前殿中有黑鵬奪門飛去中殿無異又進之軍士咸覺頭痛彭親入亦然須臾有蝎自梁蠢蠢而下大如琵琶一軍驚走彭遂火其寺

空屋邪氣毒

誤投參芪桂附陽以益陽未有不至口鼻流血不已者有婦因聞從兄自遠至更衣見之時方冬月凡所更衣皆夏日所暴而藏者婦方有娠胎為暑毒所中激而生煩腹痛脈伏熱極似寒諸醫誤認中寒參附併投病益煩悶而死

房屋園林久閉其中毒氣最盛切莫急入蓋久閉宅舍陰晦潮溼淫毒閉結不散甚或狐淫邪魅借以潛蹤蛇虺惡獸從而盤踞若夫園林深秘恐更有異物潛身必大其聲勢或先之以火驚而散之使其預匿以免卒遇相傷也

蛇虺涎

養生雜記夏月有食物過夜被蛇涎
沾上人誤食之腹內隱隱作痛時刻
患飢食之即吐用赤頭蜈蚣一條炙
為末分二服酒下
集驗方中蛇涎毒覺胸中有物如蟲
行頃刻皆亂酒調貝母末盡量飲自
愈

蛇虺涎毒

凡年久臺榭池館藤蘿花樹
蔦之下不可恣為烹飪恐為毒
中前明閩中一田姓鄉紳得一
園亭掃除初就即宴邑令於園
中其時盛夏蓮花正茂飲將午
夜席未及半邑令忽憤憤不語
疑為沈醉急扶舁回入署未幾
而殂且縣素有蠱因問傳邑侯
為本紳所毒事聞於上奏請逮
繫獄遂成然卒無可指之實各
存疑案以待再推延至十餘載
欽遣恤刑往閱及半毅然曰酖
毒之施所以復讐怨即果讐而
毒之焉有大設筵宴廣集多人
以肆其術之理因訊本紳以宴
客之園置自何年曰係購得之

非自置也訊以在內亭舍曾鼎
新否曰仍其舊惟加圻墁而已
再訊以花樹亦蔭翳可觀否曰
古樹逾圍竹木亦頗叢森更訊
以被罪後曾以售他人否曰得
此園卽膺禍人咸咎之畏不敢
售故雖家業盡零而此園獨存
恤刑隨呼縣令語以夙聞斯園
甲茲邑當卽往遊仍爲廣諭士
民各攜肴酒以示同樂更命密
具舂鍤待用衆咸莫解所以至
期恤刑攜縣令先往呼士民隨
之至則啟其園除辟草萊令士
民中有識宴邑令之所者指其
處巍然大廈蘿積重簷薜陳古
砌恤刑曰斯紳之冤吾得之矣
命諸士民各以酒肴雜坐盡飲
至醉以其餘各散

煤炭

洗冤錄編云其屍輾而無傷此脫無字非是應據增

煤熏死者口開舌出兩手微握胸前有細黑斑點肚腹脹周身並無傷痕見成案餘詳卷二火焚辨生前死後篇上層

升高并力拆毀於墻垣內得毒虺盈數石若其不經見物則不計也恤則日例占則陰沴積陰沴積則苔蘚生藤蘿附即為蛇虺窟穴之地矣而毒物又多乘陰氣以遊行若其捕生自養更以氣取宴設至夜蠅蚋之類必為叢積諸物遊行梁上改其所欲而不得涎墜肴中誤而饜之焉不立斃若非斯圖猶存冤何白以

中煤炭毒土炕漏火氣而臭穢者人受熏蒸不覺自斃其屍輾而傷與夜臥夢魘不能復覺者相似

養生雜記中煤炭毒心口作嘔或卽
暈倒急搗生蘿蔔汁灌之或清水亦
可

房中置水一盆并使窗戶有透
氣處則煤炭雖臭不能爲害

湖北補用知縣潘介繁校

洗冤錄詳義卷四

海甯許樾編校

洗冤錄表云救得一人不死便全得
兩人性命此急救方所由錄也

急救方

救縊死

救縊死

不絕其繩而從容放解則氣不驟泄
踏肩提髮而撚整喉嚨使氣得舒貫
磨擦其胸腹臂足使氣得運行尤須
綿軟裹緊大小便則氣無他溢自從
口內出又用官桂湯粥飲等管吹耳
以通順其氣自能救活當與下數節
參合行之
不可使頭垂下一語影宋本元槧本
均無

凡縊從早至夜雖冷亦可救從夜至
早稍難若心下溫一日以上猶可救
不得截繩但緩緩抱解放臥令一人
踏其兩肩以手提其髮常令緊不可
使頭垂下一人微微撚整喉嚨以手

浙江省富陽縣民何盛榮妻蔣氏於五月二十九日自縊氣尚未絕因解救不能如法致氣管仍難通順又不擦胸按腹屈伸臂足血脈仍是不行延至六月初二日身死乾隆四十八年成案

甦醒後三字宋本作勿苦勞動

擦胸上散動之一人磨擦臂足屈伸之若已僵但漸漸強屈之又按其腹如此一飯久卽氣從口出得呼吸眼開甦醒後又以官桂湯及粥飲與之令潤咽喉更令二人以筆管吹其耳內若依此救無不活者

官桂湯

廣陳皮 八分 厚樸 一錢 肉桂 五分

製半夏 一錢 乾薑 五分 甘草 三分

用手捲口

洗冤錄表云一法取活鷄新入口內
鷄鳴應聲即活

阜角細辛吹鼻

又法緊用手捲其口勿令通氣兩時
許氣急即活

真山羊血酒灌

佩觿二三分作二三釐并云不可過
多未知孰是
切忌將茶水灌

又法用真野山羊血二三分研極細
以好酒灌下立活

僵定可救

又法凡男女縊死身雖僵定尙可救
活不可割斷繩索抱起解下安放平
坦處所仰面朝上頭要扶正先將手

手佩鰓作首是洗冤錄辨正云拉直頭然後喉項方能通順若拉直手與喉項何涉且上文已云先將手足慢慢曲彎如何又要拉直應據改洗冤錄表云雞冠血滴入喉鼻之內凡跌打縊溺心頭熱者均可用一法灸湧泉穴男左女右各三壯亦能救活

足慢慢曲彎然後將大小便用絲軟之物裹緊不令泄氣用一人坐於頭前兩腳踏其肩揪住頭髮將縊人之手拉直令喉項通順再用二人將細筆筒或葦筒入耳內不住口吹氣不住手撫摸其胸前用活雞冠血滴入喉鼻之中男左女右男用公雞女用母雞刻下卽能甦活如氣絕時久照前救法務要多吹多摸勿謂已冷忽

暑不救

救溺死

救溺水諸法總以出水為主。緣氣被水閉。水漸出則氣漸通矣。
元藥本或屈死人兩足以下提行。另作一條或字作又。

壁泥覆

元藥本云洪丞相在番陽有溺水者。用此法救即甦。

救溺死

水溺一宿者。尚可救。擣阜角以懸裏。納下部內。須與出水。即活。或屈死人兩足。著人肩上。以死人背貼生人背。擔走。吐出水。即活。

又法。先打壁泥一堵。置地上。卻以死者仰臥其上。更以壁土覆之。止露口。眼。自然水氣喻入泥間。其人遂甦。雖身僵氣絕。用此法亦可救。

炒沙覆面

元藥本熟作熱舊鈔本同此誤作熟應據改

醋灌

石灰納下部

倒懸灌

酒

倒懸吹

耳

灸臍

四時分別救法

又法。炒熟沙覆死人面。上下著沙。只

畱出口鼻。沙冷溼。又換數易。即甦。

又醋半盞灌鼻中。

又絛裏石灰納下部中。水出即活。

又倒懸。以好酒灌鼻中及下部。

又倒懸。解去衣。去臍中垢。令兩人以

筆管吹其耳。

又急解死人衣服。於臍上灸百壯。

又撈起時。急急將口撬音開。橫銜箸。

一隻使可出水。以竹管吹其兩耳。碾生半夏末。吹其鼻孔。皂角末置管中。吹其穀道。如係夏月。將溺人肚皮橫覆牛背之上。兩邊使人扶住。牽牛緩緩行走。腹中之水自然從口中並大小便流出。再用生薑湯化蘇合丸灌之。或生薑汁灌之。若無牛。以活人覆臥躬腰。令溺人如前將肚腹橫覆於活人身上。令活人微微動搖。水亦可

救凍死條下云冬月溺水之人雖纖
毫人事不知但胸前有微溫皆可救
倘或微笑必爲急掩其口鼻如不掩
則笑而不止不可救矣切不可駭令
近火但一見火則必大笑不可救藥

出若一時無牛兼活人不肯拯救或
鍋一口將溺人覆於鍋上亦可如係
冬月急將溼衣解去爲之更換一面
炒鹽用布包熨臍一面厚鋪被褥取
甕內不著草灰多多鋪於被褥之上
令溺人覆臥於上臍下墊以縣枕一
個仍以草灰將渾身厚蓋之灰上再
加被褥不可使灰眊於眼內其撬口
銜箸灌蘇合丸生薑湯吹耳鼻穀道

燒臍
臍

脫衣更
換

等事俱照夏天法。冬天甦醒後宜少飲溫酒。夏天宜少飲粥湯。按灰性煖而能拔水。凡蠅溺水死者。以灰埋之。少頃卽活。此明驗也。

又以酒罈一個。紙片一把。燒放罈內。急以罈口覆臍上。冷卽再燒紙片。放罈內。覆臍。去水卽活。

又初救起之時。尙有微氣。或胸前尙煖。速令生人脫貼身裏衣。爲之更換。

燹紙熏

近時遇中風中暈等人昏迷不省以
臥龍丹通關散諸藥吹入鼻孔頃
刻即嚏較阜角末尤驗

抱擔身上將屍微微倒側之令其腹
內水流出若水往外流即有生機一
面用粗紙燎灼取煙熏其鼻竅稍熏
片時即用阜角研細吹入鼻竅但得
微有一嚏噴即可得生

傷未透膜

刃傷透膜則難救

治刃傷

元槩本半溫作通口通口者一口呷盡也半溫者不大熱也當以半溫爲是宋本止上有血字此段論本書體例應作小注元槩本此爲前半段尚有後半段云曾以語樂平知縣鮑旂及再會鮑曰蔥白甚妙樂平人好鬪多傷每有殺傷公事未暇詰問先將蔥白傳傷損處活人甚多大辟爲之減少出張聲道經驗方等語據此似不可刪

凡般傷不透膜者乳香沒藥各一阜角子大研爛以小便半盞好酒半盞同煎半溫服然後用花蕊石散或烏賊魚骨或龍骨爲末敷瘡口上卽止昔推官宋瑒定驗兩處般傷氣偶未絕亟令保甲取蔥白熱鍋炒熱徧敷傷處繼而呻吟再易蔥白傷者無痛矣

洗冤錄續編馬前子壹斤根殼壹斤於屋下雨水不及常有人溺之溺缸將前二物放入浸至四十九日取起長流水淘淨將馬前子用磁鋒刮去面上薄皮枳殼破開挖去瓢各晒乾切片用黃土拌炒微焦黑去黃土研極細末磁餅收貯無論跌打手足木石金刃各傷以及湯火傷並火藥毒箭傷均治凡傷痕已破損見血或已潰爛者將藥乾敷如腫而未破者用黃酒調敷若湯火傷泡起未破者用麻油調敷泡已破乾敷傷重者急以一錢五分熱黃酒一碗沖服不能飲者作二三次服此百試百效之方也

花蕊石散

乳香

沒藥

羌活

紫蘇

蛇含石

童便煨三次

草烏

厚樸

白芷

細辛

降香

當歸

南星

輕粉

蘇木

檀香

龍骨

各二錢 麝香 三分

花蕊石

五錢 童便煨七次

右共研極細。罐收。聽用。蔥湯洗淨。

刀傷血
出不止

血流不止用千年石灰或生半夏研
細末敷上或用乾麩和白糖搽傷處
均立效
紫藤香忌銅鐵器故用蓋刮石礪

刀傷痛
不可止

用此糝之。輾絲紙蓋扎。一日一換。

神效。

又被刀傷。血出不止。用紫藤香。

剉透香佳

者。薺瓦鏹刮下。石礪碾細敷之。血即

止。又無癰痕。

又刀刀傷。痛不可止。用好雞骨炭。擲

地上。鏗然有聲者。與松香明透者等

分。捶成一塊。再多用老韭菜擣汁。拌

入陰乾。如此拌捶三四遍。後為細末。

出金瘡腸

近時治金瘡並跌打損傷骨斷筋折血流不止者以七釐散為最驗用飛淨朱砂壹錢二分當門麝香梅花冰片各壹分二釐乳香沒藥紅花各壹錢五分血竭壹兩兒茶二錢四分各研細末稱準淨數再合研極細磁餅收貯臨用先以藥七釐燒酒沖服復用藥以燒酒調敷傷處如見血急以此藥乾糝立時見效并治一切無名腫毒亦照前法調服

收貯上已端午七夕等日製之敷患處痛立止完好如常

金瘡腸出者用小麥五升水九升煮四升。縣濾淨汁待極冷令病人臥席上一人含汁嚙其背則腸漸入。嚙時勿令病人知之及多人在旁言語。如未入擡席四角輕搖則自入。既入者須用麻油潤線縫緊仍以潤帛紮束。慎勿驚動使瘡口復迸

箭鏃傷

治箭鏃木竹器傷者用艾絨攤成餅
于將火硝細末鋪上再用大蜋蝦搗
成末鋪火硝上包傷處一日夜即拔
出

治誤吞鏃方以大蝦蟆挖取眼睛酒
沖服下其鏃即穿入睛內從大便而
出

被箭鏃傷者用陳醃肉去皮取紅活
美好者用其肥細切剉濃將象牙末
及人所退爪甲爲末共研極細拌入
所剉醃肉內再爲勻剉令其合一厚
敷箭鏃周圍一飯頃其鏃即自爲逆
脫。

蚌漿掃
治

凡遇湯火傷一時驟難覓藥先飲童便一盞再將生大黃細末用麻油調敷爛至肌肉者用百艸霜三錢輕粉一錢五分研末用麻油敷之
又方用大麥以淨沙鍋炒之以漆黑為度取出隔紙攤土上山火氣研細末爛者乾糝末破者用麻油調敷
又方用蛇皮煨存性將真菜油調敷一宿即愈又絲瓜煨灰敷之亦愈

讀律佩編載此條於層層掃入上有隨乾隨加四字可見不是但掃一次即能見效若去此四字便誤事矣應據增

救湯火傷

湯潑受傷急覓水中大蚌置甕盤中將其口向上置無人處俟其口自開時預將冰片二三分真當門麝二三分同研細末以匙挑一二分傾入蚌口內其口即合而蚌內之肉即化為漿然後再入冰麝少許用雞翎黏掃傷處先從四面邊沿層層掃入痛楚自減如無大蚌小者亦可此急救最

冰片摩治

禁用冷物

杭粉調塗

佩觿於火氣已退下有由白轉紅由紅漸淡塗上不即乾即防其潰處腐害二十字此謂慢慢細察轉色又恐不乾腐潰再將蚌殼灰圍掃若但云火氣已退其如何是退便不明白此二十字不可無

又從邊圍掃下佩觿有俟蚌漿未乾時用絹篩將蚌殼灰勻篩傷處或竟將蚌漿調勻雞翎敷上外以舊絹護之更加抹熟粗紙數層紮束令緊沁去傷中毒水如覺稍痛仍用蚌漿四面滲入內服甯心敗毒之劑以除煩無不立愈等云如此方為詳細又如無蚌處下有如其地有藏冰急取冰一小塊從四圍摩起今錄中將冰塊易作冰片設誤以此為藥品貽害匪淺不可不亟正也應據改

驗之第一方也。及其火氣已退。將用下蚌殼燒灰存性碾細末入冰麝少許。從邊圍掃。如無蚌處用冰片從四面摩起。漸及於中。亦可漸瘥。凡被湯火切勿以冷水冷物及井下泥尿泥激之。其熱氣遇冷則入之愈深。輕者攣縮重則直逼火毒攻心而速之死矣。

一法。用好杭粉為細末。同婦女所用

陳醬寬塗

劉寄奴糯米漿掃

鹽末急

大黃醋敷

好頭油調塗之。如無，或柏子油亦可。又法用多年陳醬寬塗之。但愈後有黑癰。

又用劉寄奴爲末。先以糯米漿雞翎掃傷著處。後糝藥末。並不痛。亦並無痕。大約湯火著。急以鹽末糝之。護內不壞。然後用藥敷之。至妙。

又用生大黃。以米醋調敷。二日即愈。

地漿灌救

說文喝傷暑也玉篇中熱也漢書武帝紀元封四年夏大旱民多暍死

禁喫冷水

冷水激之暑毒攻內死之必速方書云凡暑病有傷暑有中暑傷暑者或貪受陰涼為寒所襲頭疼發熱霍亂吐瀉宜香薷飲以溫通之中暑者即中喝或遠行勞役大熱而渴陽氣內伏卒然昏暈少與冷水即死亦禁臥冷地溼地急移其人於陰處再以熟土放臍上撥開作窩令人尿其中

熱湯淋臍

中以生薑或蒜搗汁和童便或熱湯灌之立甦切忌香薷等溫散之品此傷中暑所當分別而治之者也

救中喝

喝死於行路上旋以刀鐮掘開一穴入水搗之取爛漿以灌死者即活中喝不省人事者與冷水喫即死但且急取竈閒微熱灰壅之復以稍熱湯蘸手巾熨腹脇閒良久甦醒不宜便與冷物喫暑月熱倒急扶在陰涼處切不可與冷水飲當以布巾衣服等蘸熱湯覆

氣海在臍下一寸五分

熱土瘠

湯 溺瘠代

蒜水研

前言與冷水喫即死此言以冷水送下未免自相矛盾據方書宜改用熱湯下條新汲水亦恐未宜

臍下及氣海開續以湯淋布帛上令徹臍腹但煖則漸甦也如倉卒無湯處掬道上熱土於臍端以多為佳冷則頻換後與解暑毒藥或道塗無湯處即掬熱土於臍上仍撥開作窩子令眾人旋溺於其中以代熱湯亦可取效。

凡中暑如已迷悶嚼大蒜一大瓣冷水送下如不能嚼即用水研灌之立

生蔥解渴

胡麻研末調服

炒灰熨心

新汲水乃初出井水不可驟飲惟調胡麻末喫下或可無妨

醒路中倉卒無水渴甚急嚼生蔥二

寸許和津同嚥可抵飲水二升

中暑暴死以胡麻一升炒黑攤冷爲

末新汲水調下

救凍死

凍死四肢直口噤有微氣者用大鍋

炒灰令煖袋盛熨心上冷卽換之候

目開以溫酒及清粥稍稍與之若不

先溫其心便以火炙則冷氣與火爭

凡凍僵之人非但火不可近卽極熱之茶極熱之湯不可驟與之飲雖其

藺薦捲
跣

溺水凍
極毋令
近火

害不至如近火之甚但不知而驟飲
則滿口之齒盡落

冷氣凝結二人相對以足推滾使血
活氣舒自然甦醒

杆各本作杆形近而譌據宋本改說
文杆庫展衣古案切

寒氣遇火逼入內臟則笑而無救中
寒之不可驟近火猶中暑之不可驟
飲冷水其理一也

必死。

又用藺或藁薦捲之以索繫定放在
平穩處令二人相對跣令滾轉往來
如杆藺法候四肢溫卽活

冬月溺水之人及被凍極之人雖纖
毫人事不知但胸前有微溫皆可救
倘或微笑必爲急掩其口鼻如不掩
則笑而不止不可救矣切不可驟令
近火但一見火則必大笑不可救藥

鹹足呼
名唾面
徐灌薑
湯

此條見奇效良方生薑陳皮下有各
一兩三字應據補

說文魘夢驚也方書肝藏魂者也游
魂為變平人肝不受邪以則魂歸於
肝神靜而得寐若肝有邪魂不得歸
是以臥則飛揚常多驚魘治法以獨
活湯送真珠母丸以安魂定驚湯用
人參獨活羌活前胡各一錢茯苓半
夏沙參炒棗仁各二錢細辛三分炙
甘草五分烏梅半個五味子十四粒
生薑一片水煎丸用珠母二錢五分
當歸熟地各五錢人參炒棗仁柏子
仁茯苓各三錢犀角沈香龍齒各一
錢五分為末蜜丸朱砂為衣

凡凍死已經救活者宜用生薑帶皮
陳皮隨碎用水三碗煎一碗溫服

救魘

魘死不得用燈火照並不得近前急
喚但痛齧其足跟及足大拇指頻頻
呼其名及唾其面再灌以薑湯必活
魘不醒者移動些小臥處徐徐喚之
即醒夜間魘者原有燈即存燈無燈
者不可用燈照

吹耳刺鼻

鹽湯灌

救

韭汁灌

救

元槩本無得嚏二字

灸足大指

元槩本豆上有大字此脫應據補

阜角吹鼻

蘇合丸調灌

又用筆管吹兩耳。及取病人頭髮二

七莖。撚繩刺入鼻中。○又鹽湯灌之。

又研韭菜汁半盞灌鼻中。冬用根亦

可得嚏。

又灸兩足大拇指聚毛中三七壯。聚

乃脚指向
上生毛處

又方阜角末如豆許吹兩鼻內得嚏

則氣通三四日者尚可救。

壓死者若身未冷急以酒調蘇合丸

非黃刺鼻

阜角半夏吹鼻

沈氏尊生書中惡者口鼻吸著鬼氣也。凡人偶入荒墳古廟人迹罕到之處忽見鬼物。卒然昏倒。四肢厥冷。口鼻出清血白沫。慎勿輒動。速令眾人圍繞打鼓。熏香候避。方可移歸調治。客忤者感觸邪惡之氣也。多於道路得之。即時昏暈。心腹絞痛。脹滿氣逆。心胸不達。治亦能殺人。急取鹽如雞子大炒熱。納酒中灌之。令吐出惡物。然後服藥。

凡中惡客忤卒死者。或先病及睡臥。開。忽然而絕。皆是中惡也。用韭黃心於男左女右鼻內刺入六七寸。令目開血出。即活。開上唇內沿。有如粟米粒。以鍼挑破。又用阜角或生半夏末。如大豆許吹入兩鼻。

灌之即活

救中惡

羊屎熏

鼻

醋汁入

鼻

元氣本醋作酒前救溺死篇亦有醋半盞灌鼻中一條又有酒灌鼻中一條當是醋酒均可用也

灸臍吹
鼻灌耳

灸則艾氣攻達吹則皂角通竅灌則韭汁散邪自有奇驗

菖蒲研
汁灌救

溫酒灌
救

又用羊屎燒煙熏鼻中。

又縣浸好醋半盞手按令汁入鼻中。

及捉其兩手勿令驚須臾即活。

又灸臍中百壯鼻中吹皂角末或研

韭汁灌耳中。

又用生菖蒲研取汁一盞灌之

救驚斃

驚怖死者以溫酒一兩杯灌之即活。

救撲打卒死

捏髮吹鼻

凡救五絕之法急於人中穴及兩足大指中外側離一韭葉許各灸三五壯即活

撲打壯倒在地者用血管搗毛煨存性一錢乳香沒藥百兩霜各一錢共為末老酒調服即醒

凡跌打損傷者用人中白煉紅投好醋七次研末已死者勿移動將藥末二錢好酒送下吐出惡血即可救矣但移動者不治

救五絕之法全在通關開竅使氣得展舒此方止用生半夏一味以其能開通關竅作噴嚏也

蘇合九調灌

五絕及撲打卒死等但須心頭溫煖雖經日亦可救先將死人盤屈在地如上僧打坐狀令一人將死人頭髮控放低用生半夏末以竹筒或紙筒筆管吹在鼻內如活即以生薑自然汁灌之可解半夏毒五絕者謂產魅用半夏一味○生薑自然汁用生薑搗爛取汁不用水者是卒暴墮頭築倒及鬼魔死若肉未冷急以酒調蘇合香丸灌入口若下喉

傷重昏
暈救法

跌壓與撲打無異。撲打跌壓雖分有心無心。而其氣血受傷則一。大氣運乎血。血本隨氣以周流。氣滯則血凝。而經絡藏府并與俱傷。其患遂不可勝言。大法以導氣行血為主。打撲跌傷內損經絡吐血不止。竟便調白朮末服。

此條載見佩觿云。先拳其兩足束其兩手。又少頃二字作俟。有微氣又不令洩氣。下有扶坐少頃。然後緩緩呼之十字。此等皆緊要情節。未便抹去。致有遺誤。

去可活。

救跌壓傷

凡跌壓傷重之人。口耳出血。一時昏暈。但視面色。尙有生氣。身體尙爲鬆軟。則皆可救。但不可多人環遶嘈雜。驚慌。致令驚魂不復。急令親人呼而扶之。坐於地上。先拳其兩手兩足。緊爲抱定。少頃再輕移於相呼之人懷中。以膝抵其穀道。不令洩氣。若稍有

童便馬
溺熱灌

加味四
物湯雜
救

肢體全仗血氣傷損必加補養初治
消瘀和血爲急若去血過多服微欲
死者獨參湯加童便服接住元氣

知覺卽移於素所寢處將室內窗櫺
遮閉令暗仍拳手足緊抱不可令臥
急取童便乘熱灌之馬溺更妙如一
時不可得卽人溺亦可要去其頭尾
但須未食蔥蒜而清利者強灌一二
杯下得喉去便好一面用四物湯照
原方加三四倍再入桃仁去皮尖及
好紅花各一兩全當歸及南山查攪
碎各二兩生大黃二兩童便一大鍾

用急流水取其性速而趨下也在勿煎藥欲使藥氣漸漸透達患處也藥承鼻下先令藥氣入內然後投藥汁緩以受之反有速效也藥先運氣非至緊時仍只氣動豈可驟解以洩之及動而有聲往來數徧則氣得藥力而攻惡血矣故所下盡屬瘀毒切勿急急以致有損無益

如係夏月加黃連四五分多用急流水卽在旁用急火煎半熱傾入碗內承於傷者鼻下使藥氣透入腹內則不致入口惡逆乘熱用小鍾強令頓服如其不受則姑緩少刻又進只要陸續灌盡不可使臥服藥之後其穀道尤須用力抵緊不可令其洩氣如藥已行動非至緊不可卽解恐其氣從下洩以致不救也必俟腹中動而

有聲。上下往來數遍。急不能待。方可翼之以解。所下盡屬瘀紫。毒已解半。方可令睡。至所下盡爲糞。卽停止前藥。否則再用一二劑。亦不礙。然後次第調理。不可輕用補藥。

四物湯

當歸一錢 川芎七分 熟地黃三錢

炒白芍一錢

治蛇蟲傷

沈氏錄詳義

卷四

利刀割肉

遲則毒氣流走上攻及心即死

毒蛇能斃人惟急以利刀割去所嚙之死肉可以漸解

藍汁雄黃調點

治蛇毒莫妙於斑蘭根先令患者口嚼即以嚼細之滓敷患處此物出自閩廣花有斑點葉有花紋根與蘭花根相似而較細蛇遇此蘭即化為膿并非希罕之物閩廣販藥材者常有帶來第勿以藥肆中之板蘭認作此物致有誤事

蛇傷蟲咬倉卒無藥以大藍汁一碗雄黃末二錢調勻點在所傷處併令細細服其汁如無藍以靛花青黛代之

米醋燒酒吮傷拔毒

虺蝮傷人其毒內攻即死立將傷處用繩絹紮定勿使毒入心腹令人口含米醋或燒酒吮傷以吸拔其毒隨

白芷麥冬湯調服

五靈脂雄黃酒灌救

斑蝥雞蛋蒸食

蛇咬致潰爛不愈用香白芷為末入麝香各少許水洗患處令淨以藥末敷之此條本夷堅志急下有則字較為明晰

瘋狗毒最屬人受其咬毒氣入腹頓孕小狗攻脹而死初咬猶可救藥毒

吮隨吐隨換酒醋再吮俟紅淡腫消

為度吮者不可誤嚥中毒又急飲麻

油一二盞護心解毒以薑末敷之

被蝮咬死用香白芷一味以麥冬湯

調服急以水代之飲之即活

又方用五靈脂一兩雄黃五錢以酒

調灌每服二錢再以滓塗咬處

治顛狗傷

乘毒未發用斑蝥七個去頭足翅淨

擠血盡
多飲薑
汁

已發則狗形已成不治雖敲而未破
但現青紫即已中毒宜急治之
斑蝥奔走下竅而至精弱之處能下
敗物用此以毒攻毒但初愈後忌聞
鐘鼓之聲復發則不可治又畏巴豆
丹參惡甘艸豆花不可不慎
用防風獨莖者一兩天南星一兩水
泡七次晒乾爲末每服二錢白湯下
半日再進一服出汗即愈
又法以細辛五分白芷一錢雄黃一
錢好酒研入麝香少許一服立效

用雞蛋二枚同蒸去斑蝥淡食雞蛋
於小便內取下血塊痛脹不解則血
塊未淨仍再食塊盡乃止

又法用斑蝥同米炒俟米老黃去斑
蝥將米研末蒸雞蛋食如前法血塊
下盡爲度

又法受敵後立至溪河將傷處洗擠
血淨盡多飲生薑汁則毒可解仍封
紫瘡口勿使受風

救服毒中毒方

解砒毒

服下未
久雞蛋
調礬末
灌救
服久磨
鉛水灌
救

雞蛋鎮心安厥明礬防毒內攻故服
砒未久者急用此方若已經入腹則
用鉛水鉛性重能墜下且解毒安神
多磨多灌或者有濟然終不如後方
用薑膏之為第一也
凡中砒毒心腹絞痛欲吐不吐面青
肢冷用防風二兩煎湯服之即解
又方柏樹葉搗爛沖生白酒飲之即
解
又方楊梅樹皮煎水二三碗飲之即
愈
又方用紫蝴蝶花根搗汁頻頻灌之
立愈
又方甘艸末一錢明礬五分綠豆粉

砒霜服下未久者取雞蛋一二十個
打入碗內攪勻入明礬末三錢灌之
吐則再灌吐盡便愈但服久砒已入
腹則不能吐出急用黑鉛四兩重一
塊用井水於石上磨出黑汁旋磨旋
灌盡則愈即先吐出之後亦宜再用
鉛水服之以盡餘毒方無後患

鴨血糞
清灌救

一鐵新汲井水一碗調灌下如手指紅則活黑者不治

中砒霜毒急取熱鴨血灌之立解又

豆豉湯

又方用冬青樹葉或用嫩葉更佳帶水搗汁灌下以吐為度或得瀉下亦愈

糞青灌之亦解

解法

解砒毒方不勝枚舉真靈子用防風

又方以豆豉濃煎湯飲之可解

甘艸藍汁同飲

一兩冷水調服余在京師知此方活人不少後閱紀文達如是我聞載歎

又用甘艸汁同藍汁飲之即愈

豆腐漿灌救

人蔣紫垣以醫為業有解砒毒方用之十全即此方也

又用熟豆腐漿灌之亦效

解巴豆毒

大豆煮汁冷飲

治薄粥一碗喫下即止如大豆汁等亦須冷飲若熱飲痢愈不止

中巴豆毒痢不止以大豆一升煮汁

飲之

大黃等藥冷服

又巴豆畏大黃黃連蘆笋菰笋黎蘆

蕉葉搗汁冷服

黑豆汁
連房煎水灌救

甘艸藍汁灌救

各煎冷服。皆能止泄。

又用芭蕉葉。搗自然汁服之。即止。

解鼠莽毒

黑豆汁可解。○又方。用枯蓮房殼。帶

蒂梗陰乾。咬咀煎水二三碗灌之。如

無用荷葉中心蒂。或用藕節煎湯一

碗溫冷灌之。毒即散。

解莨菪毒

用甘艸汁。或藍青汁。飲之即愈。若服

鼠莽艸以黑豆汁澆其根即爛可知其能解毒矣

咬咀各本偽作咬咀據舊藏鈔本咬方書藥之粗齊為咬咀本艸綱目注李杲曰咬咀古制也古無刀以敲細令如麻豆曰咬咀

藥即劇。

解苦杏仁毒

用杏樹皮煎湯飲之。雖迷亂將死者亦可救。

解斑痧毒

芫音官

用豬膏、大豆汁、戎鹽、藍汁服之。或用

鹽湯煮豬膏、巴豆飲之。又或用大小

黑豆汁服之。並瘥。用肥皂水灌下。再

以鵝翎攪喉數次。令吐即活。

杏樹皮
湯灌救

豬膏等
解

各方中以大小黑豆汁解斑痧毒青
毒須濃煎多服試之極效

雞鴨卵
經救

生雞鴨卵灌吐此治危險之症曾在
山左有僕患淋閉服藥發過多幾至
殞命灌之得吐而活

又方用生雞鴨卵開孔灌入口中連
灌五六枚得吐即活倘閉以箸挾開
灌入

治菌毒

掘地攪
水救治

凡菌草如夜中放光者欲爛無蟲者
煮不熟者煮汁照人無影者上有毛
下無紋者仰卷赤色者俱極毒殺入
飲以地漿及糞青俱可解
中笑菌毒飲冬瓜蘆汁立解或用苦
菜白礬調新汲井水服之
凡中菌毒莢花生研新汲水服一錢
或濃煎防風飲

四明溫台閒山谷多產菌然種類不
一食之閒有中毒往往至殺人蓋蛇
虺毒氣所熏蒸也有僧教掘地以冷
水攪之令濁少頃取飲皆得全活其
方自見本艸楓樹菌食之笑不止俗

言笑菌居山閒不可不知此法也

解胡蔓艸毒

胡蔓艸即鉤吻亦即斷腸艸

雞汁灌救

中斷腸艸毒先將服毒人扶正撬開可開則取生鴨蛋圓圖灌下三箇待蛋入胃裏住毒艸次用豬膏銕化溫和灌下一碗又用黃豆一大碗雜雞一隻連毛帶腸同豆搗爛用清水一碗泡入布袋濾渣取汁灌下其毒即吐如不吐即用鵝翎探喉毒即吐出但在胃者可治入腸者難治

中胡蔓艸毒將糞汁灌之可解或飲浸艸毒水百竅潰血急取抱卵不出之雞蛋研細和麻油開口灌之吐出可救

解蕈毒

金銀花生嚼

與菌毒治法一例須參看前治菌毒條

誤食毒蕈至吐即採生金銀花嚼之可解

解糖黑
豆冷水
救治

甘艸等
汁救治

鉛壺煮
酒任飲

射罔卽艸烏頭之汁煎成詳前諸毒
條內

解艸烏頭毒

用飴糖黑豆冷水解之。

解射罔毒

用甘艸汁或小豆葉浮萍薺苈汁冷

水解之。薺苈又名甜桔梗河南人呼
爲杏葉沙參能解百藥毒

解輕粉冰片毒

用黑鉛五斤打壺一把盛燒酒十五
斤納土茯苓半斤乳香三錢封固重
湯煮一日夜埋土中出火毒每日早

新汲水
解

桌布洗
水灌救

鷓鴣肉
等救治

凡服毒用生黃豆入水搗爛絞汁或用生大黃二兩搗碎以生豆腐漿一碗同搗數十下灌服俱效

吞金者用上好湖絲剪斷約二寸長置碗內以滾水泡軟如細麵連滾水吞下則絲自裹金從大便出其法神效

晚任飲數杯。渴時以瓦盆接之。當有粉出。服至筋骨不痛乃已。

冰片毒。飲以新汲冷水可解。

救服酒

服鹽酒。將常用擦桌布。洗水灌之。使吐即解。

治吞金

中黃金毒者。食鷓鴣肉。中白銀毒者。以黃連甘艸解之。又洗金以鹽。駱駝

輕粉調服

石礪磨水熱服

金銀光潤者能柔而下若翳碎而有尖角者鈎住腸胃易致斷腸恐未必能出

有吞金者金重墜不能出醫者惟以升麻等升提藥與服蓋漸提其氣金必漸動漸動則漸隨大便而出若鎮重不移何由令其轉運乎

凡吞銅錢者多食核桃及生葶薺自然消化

吞鐵鐵者煮蠶豆同韭菜食或用黃蠟鎔化入礪石細末合勻燃如鐵大冷水送下蠟裏鐵從大便出

驢馬脂餘甘子皆能柔金羊脂獲子

皆能柔銀吞金銀入腹中當服食前品柔則易出

又服金者用真輕粉為末水調下能

令金從大便出

解藥蠱金石毒

治一切藥毒蠱毒金石毒用石礪以

熱水磨服

解水銀入耳

黃金枕

本艸載荷葉松葉松脂敷精艸萱艸
其松夏枯艸煎湯服下皆能制汞

以黃金枕耳邊自出。若水銀入肉。令
人筋攣。以金物熨之。水銀乃出。蝕金
其病即瘥。

解煤熏毒

冷水薑
汁灌救

飲冷水可解。或蘿蔔擣汁灌口鼻。移
向風吹便能醒。

解飲餒毒

甘艸薺
芫湯解

凡中一切毒從酒得者難治。從食得
者易治。蓋酒性行諸血脈流徧體也。
食入於胃。胃能容雜毒。又逐大便。瀉
出毒氣。毒氣未流於血脈。故易愈也。

凡中飲餒毒。不知何物。即煎甘艸薺
芫湯飲之。便治。

白礬膏
試味甘
黑豆下
腥
槲皮湯
解

白礬芽
茶搗飲

保靈丹
治一切
毒

鹽多暗藏飲食內行之中其毒者必
腹絞痛如有物嚙噬或吐下皆如爛
肉或好卧暗室或乍噴乍喜或吐逆
不定或面目青黃甚者十指俱黑其
毒有緩有急急者愈卒或數日即死
緩者延引歲月游走腸胃蝕五藏盡
則死

此條載見宋蔡條鐵圍山叢談惟石
槲皮湯作石槲根皮未知孰是各本
作皮根誤叢談下字上有不字言不
大便也不大便即上吐如誤作飲下
解便非
此方當照開藥味預行修合以備急
需可治諸毒非僅專治鹽也

治鹽毒及金蠶蠱

泉州一僧能治金蠶蠱毒如中毒者
先以白礬末令嘗不澀覺味甘次食
黑豆不腥乃中毒也即濃煎石槲皮
湯飲之下即吐出蟲皆活無不愈者
李晦之云凡中毒以白礬芽茶搗為
末冷水飲之即愈

保靈丹 治鹽毒諸毒
一切藥毒

大山豆根 半兩 雄黃 硃砂 淨細研
一兩

雄黃黃藥子黃丹麝香均不注若干錢數非是查醫學祕要載此方雄黃等四味各二錢五分應據補

祕要云如遇急用但擇吉日精潔修合以石灰襯紙收乾又於不得嚼破下云病人自覺心頭如拽斷皮條聲須與毒物下或自口出或大便出嫩出血老則成髓或蜣蝨諸動物隨藥丸並下其病如失瘥後忌酒食發物一月服淡尤妙較此詳明應據改

黃藥子 黃丹 麝香

斑蝥 二錢半 去頭足 續隨子 生杵末 二錢半

糯米 半生 半炒 大赤蜈蚣 二條一 生一炙

川巴豆 肥者取肉不 去油二錢半

右藥入乳鉢研和於端午重陽臘

日修合宜避婦人及雞犬用糯米

湯和丸如龍眼核大陰乾蠶合收

每一丸好茶清吞下不得嚼破須

與毒物下藥丸凝血並下以水淨

鰻鱺魚卷三金蠶蠱毒條上層衛載各蠱名
未救治目及治法當參看

收可救三人。

治諸蠱毒用鰻鱺魚乾末空心服之。
魚或燒炙令香食之。其魚有五色文
者佳。

志云嶺南俚人解蠱毒畏人知
其方乃詭言三百頭牛藥或云
三百兩銀藥久與親狎始得其
實所云三百頭牛藥者土常山
也三百兩銀藥者馬兜
鈴也俱用水煎服即愈
福清縣有訟遭金蠶蠱毒者縣令
治之不得蹤或獻謀取兩刺蝟
入捕必獲蝟獸類遍身有刺如
栗房蓋即山中之刺鼠也金蠶

畏蝟蝟入其家金蠶不敢動雖
匿榻下牆飲盡爲兩刺蝟擒出
之

三神湯

辟穢丹

各本脫能辟屍氣四字據宋本及舊
鈔本增宋本屍作死洗冤錄辨正云
言能辟死氣則與後能辟穢氣之辟
穢丹稍別
毛氏經驗方載有辟瘟丹云時疫大
行恐其傳染急服此藥雖與病者同
居亦無害藥用丹參壹兩赤小豆壹
兩鬼箭羽壹兩雄黃五錢共為末煉
蜜丸如桐子大每日空心酒下七丸
甚驗

辟穢方

三神湯能辟屍氣

蒼朮

二兩米泔浸
兩宿焙乾

白朮

半兩

甘艸

半兩

右為細末。每服二錢入鹽少許點

白湯服。

辟穢丹能辟穢氣。

麝香

少許

細辛

半兩

甘松

一兩

川芎

二兩

蘇合丸

此方載見宋時太平和濟局方及蘇沈良方兩書藥共十五味並無天麻台烏白豆蔻肉等三味蘇沈云九如雞頭實大每服一丸溫酒嚥下大能安氣血卻外邪凡疾自內作不曉其名者服此往往得效惟治氣瘕氣厥氣逆氣不和吐利榮衛阻塞尤有神功嘗見嘔血奄奄即絕傷寒日久而死心窩尚煖腹瀉諸藥不效病瘵日漸羸削並霍亂邪氣瘟疫瘧疾疰瘵疔腫等疾服之均驗惟古方雖云用酒化下多不相宜只白湯為佳

右為細末。蜜圓如彈子大。久窰為

妙。每用一圓燒之。

蘇合丸。每一丸含化九能辟惡。

犀角尖 丁香 香附

安息香 明天麻 沈香

白朮 檀香 木香

畢撥 硃砂 訶子肉

麝香 蘇合油 白豆蔻肉

台烏各二兩 大片腦 乳香各二兩
或一兩

藥味只三十六兩斷無用蜜至六斤之理卽黃蠟更不能三十斤之多以每藥一錢作九計之不過三百六十九當以粵東所售之各種蠟九權蠟殼之輕重每殼重一錢二分合計只須二斤十一兩二錢是三十斤必係三斤之誤蜜六斤當是六兩之誤要在修合時以意消息爲是

黃蠟三十斤或蜜六斤或金箔一百片

右藥一十八味各取淨末煉蜜搗

和爲丸金箔爲衣用蠟作九裏之

或不用蜜丸別以糯米糊搗和印成香佩亦妙

湖北補用知縣潘介繁校